



**BIOTIČNO  
VARSTVO  
RASTLIN**

# STROKOVNA EKIPA

## BIOTIČNO VARSTVO

Poljščine, sadovnjaki, vinska trta in vrtnine

The map of Slovenia is divided into three main regions: red (west), blue (center), and green (east). Each region is associated with a staff member whose portrait is shown in a circular inset. The red region (Gorenjska, Primorska, Goriška, osrednja Slovenija) is associated with Maja Črešnar. The blue region (Koroška, Savinjska in Dolenjska) is associated with Peter Ocvirk. The green region (Prekmurje, Štajerska) is associated with Igor Sternad. Additionally, two other staff members, Ana Potočnik and Blaž Rebolj, are shown in circular portraits to the right of the map.

**MAJA ČREŠNAR**  
univ. dipl. ing. agr.  
Gorenjska, Primorska, Goriška,  
osrednja Slovenija  
031 685 554  
maja.cresnar@picount.si

**PETER OCVIRK**  
trgovski potnik  
Koroška, Savinjska  
in Dolenjska  
041 414 971  
peter.ocvirk@picount.si

**IGOR STERNAD**  
ing. kmetijstva  
Prekmurje, Štajerska  
031 685 599  
igor.sternad@picount.si

**ANA POTOČNIK,**  
dipl. inž. agr. in hort. (VS)  
**Logistika**  
08 205 32 01, 051 663 222  
ana.potocnik@picount.si

**BLAŽ REBOLJ,**  
univ. dipl. ing. agr.  
**Registracije**  
051 333 351  
blaz.rebolj@picount.si

## Okrasne rastline



**PRIMOŽ VIDOVIČ**  
univ. dipl. ing. zoot.  
Prekmurje, Koroška, Štajerska  
031 638 303  
primoz.vidovic@picount.si



**MARTINA ŽAGAR**  
univ. dipl. ing. agr.  
Dolenjska, Gorenjska,  
Goriška, Primorska  
031 649 444  
martina.zagar@picount.si



**IGOR KELENBERGER**  
Tehnični direktor  
Štajerska, Savinjska  
041 690 583  
igor.kelenberger@picount.si

<b>4</b>	<b>BIOTIČNO VARSTVO PROTI PRŠICAM</b>	
	<i>Amblyseius andersoni</i> .....	4
<b>5</b>	<b>BIOTIČNO VARSTVO PROTI RESARJEM</b>	
	<i>Amblyseius cucumeris</i> .....	5
	<i>Orius majusculus</i> .....	6
	<i>Aeolothrips intermedius</i> .....	7
<b>9</b>	<b>BIOTIČNO VARSTVO PROTI ŠČITKARJEM</b>	
	<i>Encarsia formosa</i> .....	9
	<i>Macrolophus pygmaeus</i> .....	10
<b>11</b>	<b>BIOTIČNO VARSTVO PROTI UŠEM</b>	
	<i>Adalia bipunctata</i> .....	11
	<i>Exochomus quadripustulatus</i> .....	12
	<i>Aphidius ervi</i> .....	13
	<i>Aphidoletes aphidimyza</i> .....	14
	<i>Sphaerophoria rueppelli</i> in	
	<i>Episyrphus balteatus</i> .....	15
	<i>Chrysoperla carnea</i> .....	16
	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> .....	17
<b>19</b>	<b>BIOTIČNO VARSTVO PROTI HRUŠEVI BOLŠICI</b>	
	<i>Anthocoris nemoralis</i> .....	19
<b>20</b>	<b>BIOTIČNO VARSTVO PROTI KORUZNI VEŠČI</b>	
	<i>Trichogramma Brassicae</i> .....	20
<b>21</b>	<b>BIOTIČNO VARSTVO PROTI LISTNIM ZAVRTAČEM</b>	
	<i>Diglyphus isaea</i> .....	21
<b>22</b>	<b>BIOTIČNO VARSTVO PROTI MARMORIRANI SMRDLJIVKI</b>	
	<i>Anastatus bifasciatus</i> .....	22
<b>23</b>	<b>BIOTIČNO VARSTVO PROTI ZELENIM SMRDLJIVKI</b>	
	<i>Trissolcus basalus</i> .....	23
<b>24</b>	<b>BIOTIČNO VARSTVO PROTI PLODOVI VINSKI MUŠICI</b>	
	<i>Trichopria drosophilae</i> .....	24
<b>25</b>	<b>BIOTIČNO VARSTVO PROTI ŠKODLJIVCEM KORENINSKIH SISTEMOV</b>	
	<i>Heterorhabditis bacteriophora</i> .....	25
	<i>Steinernema carpocapsae</i> .....	26
	<i>Steinernema feltiae</i> .....	27
<b>30</b>	<b>FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA NA PODLAGI MIKROORGANIZMOV</b>	
	BOTECTOR.....	30
	CARPOVIRUSINE.....	30
	POLYVERSUM.....	30
<b>30</b>	<b>PROFESIONALNA SREDSTVA - OSNOVNE SNOVI ZA VARSTVO RASTLIN</b>	
	AGRICOLLE.....	30

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Amblyseius andersoni*  
plenilska pršica

odrasel osebek:

### CILJNI ORGANIZEM

pršice iz družine pršic prelki (*Tetranychidae*); kot so:  
rdeča sadna pršica,  
navadna pršica



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

*Amblyseius andersoni* je evropska vrsta, ki je prisotna v različnih habitatih, kjer pa je njena prisotnost običajno zmanjšana zaradi uporabe zaščitnih sredstev. Sredstvo je primerno za uporabo tako v trajnih nasadih vinske trte, sadno drevje in številnih drugih kulturah kot so paradižnik, jajčevci, bučke in okrasne rastline. V naravi prezimi v diapavzi. Aktiven postane, ko temperature zanesljivo presežejo 8-10 °C, aktiven pa ostane tudi pri temperaturah 35-40 °C.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

*Amblyseius andersoni* je plenilec za zatiranje pršic iz družine pršic prelki (*Tetranychidae*). Je polifagni plenilec, ki lahko pleni tudi pršice šiškarike (*Eriophyidae*), majhne žuželke in se hrani s cvetnim prahom. To omogoča stabilno naselitev v mnoge posevke. Vrsta je zato posebej primerna za preventivno naselitev ob odsotnosti najbolj značilnega plena.

### NAČIN UPORABE:

Uporablja se preventivno, zgodaj v sezoni. Gostota naselitve je odvisna od situacije odraslih osebkov na m<sup>2</sup>.

### GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:

Vinska trta, sadno drevje, jagoda, paradižnik, paprika, jajčevci, bučke, kumare, hmelj, okrasne rastline in druge rastlinske vrste.

### DOVOLJENA UPORABA:

Na prostem in v zavarovanih prostorih.



#### ODMEREK

Priporočena količina izpusta je okoli 10 ali več plenilcev/m<sup>2</sup>. Aplikacija se večkrat ponavlja dokler se ne doseže populacija 30-50 pršic/m<sup>2</sup>.



#### TRGOVSKO IME

Anderbags  
Anderpak  
Andersak



#### PAKIRANJE

250 vrečk x 250 odraslih osebkov,  
kartonski tulec z 25 000 odraslih osebkov  
kartonska embalaža z 125000 odraslih osebkov



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti na hladnem pri najmanj 10 °C in ga uporabite takoj ali najkasneje v 24 urah.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Amblyseius cucumeris*  
plenilska pršica

odrasel osebek:

## CILJNI ORGANIZEM

resarji - cvetlični resar  
(*Frankliniella occidentalis*),  
tobakov resar (*Thrips  
tabaci*) in drugi



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

*Amblyseius cucumeris* je hruškaste oblike, čeprav je majhen je zelo mobilen, ter lahko uporablja tudi druge vire hrane, vključno s cvetnim prahom. Njegov razvoj je zelo hiter, saj celoten cikel traja največ 1-2 tedna. Optimalna razmere za njegov razvoj so temperature okrog 18-20 °C ter visoka relativna vlažnost.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

*Amblyseius cucumeris* se uporablja za biološko zatiranje resarjev (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci* in drugih) na številnih vrstah zelenjave in okrasnih rastlin.

### NAČIN UPORABE:

Najbolje jih je naseliti preventivno v začetnih fazah rasti, saj se ob odsotnosti škodljivca lahko prehranjuje polifagno. Priporoča se uporaba v necvetočih nasadih.

### GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:

zelenjadnice, (kumare, paprika, jajčevac, jagoda, čebula, zelje), okrasne rastline

### DOVOLJENA UPORABA:

na prostem in v zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

Priporočena količina izpusta je  
50 ali več plenilcev /m<sup>2</sup>.

Aplikacija se večkrat  
ponavlja, dokler se ne doseže  
populacija 200-300 pršic/m<sup>2</sup>.



#### TRGOVSKO IME

AmblyPAK

AmblySAK

AmblyBAG



#### PAKIRANJE

Plastenka - 50.000 odrastlh  
osebkov

Plastenka - 250.000 odraslih  
osebkov

500 vrečk(sašetek) x1000  
odraslih osebkov



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti  
na hladnem pri najmanj 10 °C  
in ga uporabite takoj  
ali najkasneje  
v 24 urah.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Orius majusculus*  
cvetna plenilka

odrasel osebek:

### CILJNI ORGANIZEM

resarji - cvetlični resar  
(*Frankliniella occidentalis*),  
tobakov resar (*Thrips tabaci*)  
in drugi



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

*Orius majusculus* ima 6 razvojnih faz, ki so vse plenilske. Nimfa lahko poje 50 ličink resarja na dan. Odrasli osebek lahko poje 20 nimf ali 6 odraslih osebkov resarja dnevno. Če plen ni prisoten se lahko prehranjuje s cvetnim prahom. Aktiven je pri temperaturah 8-30°C.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

*Orius majusculus* se uporablja na številnih cvetočih rastlinah, kot so jajčevci, paprika, jagode ter okrasne rastline za zatiranje resarjev.

### NAČIN UPORABE:

Enakomerno razporedite žuželke neposredno po vegetaciji na več mestih. Ker ne mara svetlobe, zato se ob izpustu takoj skrrije v cvet. Prvi izpust se izvede ob začetku cvetenja.

### GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:

zelenjadnice (kumare, paprika, jajčevci, jagode) in okrasne rastline

### DOVOLJENA UPORABA:

na prostem in v zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

1-3 osebk/m<sup>2</sup> ob vsakem izpustu. Priporoča se 2-3 izpuste. Skupna izpuščena populacija naj bo 2-6 osebkov /m<sup>2</sup>. Za jagode se priporoča 5 izpustov, po 1 osebek/m<sup>2</sup> ob vsakem izpustu.



#### TRGOVSKO IME

OriusM500



#### PAKIRANJE

Plastenka - 500 odraslih osebkov



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti na hladnem pri najmanj 10 °C in ga uporabite takoj ali najkasneje v 24 urah.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Aeolothrips intermedius*  
Plenilski resar

odrasel osebek:

### CILJNI ORGANIZEM

tobakov resar (*Thrips tabaci*),  
rastlinjakov resar (*Heliathrips  
haemorrhoidalis*), resarji -  
cvetlični resar  
(*Frankliniella occidentalis*)  
in drugi



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

Samica je črne barve in velika nekaj milimetrov, ter ima tri tipične svetle prečne trakove na telesu. Samec je podoben, vendar lažji in manjši. Ličinke so popolnoma rumenkaste. Odrasle osebkje najdemo na različnih rastlinah, predvsem na cvetovih, kjer se hranijo s cvetnim prahom in žuželkami. Samice izležejo 50 jajčec. Mlade faze se hranijo s cvetnim prahom in plenom. Razvojni cikel traja 20 dni pri 25 °C.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

*Aeolothrips intermedius* je predator, ki prav tako pripada resarjem in je razvil močan plenilski odnos do resarjev drugih vrst in ostalih manjših organizmov, ki jih sreča v okolju. Pleni okoli 40 različnih vrst resarjev, predvsem tobakovega resarja (*Thrips tabaci*) in rastlinjakovega resarja (*Heliathrips haemorrhoidalis*). Plenijo tudi pršice v vseh stadijih.

### NAČIN UPORABE:

Enakomerno razporedite žuželke neposredno po vegetaciji na več mestih, najbolje na cvetove. Odrasli osebki so dobro mobilni in spretni letalci, zato se hitro razporedijo po okoliških rastlinah.

### GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:

zelenjadnice (kumare, paprika, jajčevec, jagode) in okrasne rastline

**DOVOLJENA UPORABA:** na prostem in v zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

Priporočena količina izpusta so skupno 1 do 4 osebkje na m<sup>2</sup>, ki jih razporedimo na več izpustov. Prvi izpust se naredi še pred pojavom resarjev in nato ponovi po nekaj tednih, odvisno od ostalih dejavnikov.



#### TRGOVSKO IME

EOLO200



#### PAKIRANJE

200 odraslih osebkov



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti na hladnem pri najmanj 10 °C in ga uporabite takoj ali najkasneje v 24 urah.

Zapiski:



## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Encarsia formosa*  
Parazitoidna osica

odrasel osebek:

## CILJNI ORGANIZEM

rastlinjakov ščitkar  
(*Trialeurodes vaporariorum*)  
in tobakov ščitkar  
(*Bemisia spp.*)



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

Samice najezdника rastlinjakovega ščitkarja (*Encarsia formosa*) so majhne približno 0,6mm dolge in imajo črno glavo in trup ter rumen trebuh. Samci so redki ter temne barve. Razmnoževanje je partenogenetsko - telitokija. Iz neoplojenih jajčec se izlegajo le ženski osebki. Izleže cca. 5 jajc/dan ter 59 v času 12 dni, ko izlega jajčeca. Pri 21°C celoten krog traja 25dni. Svoj plen zatira tako preko endoparazitiranja kot tudi s plenilskim hranjenjem.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

*Encarsia formosa* je endoparazit, ki se že desetletja uporablja za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja (*Trialeurodes vaporariorum*) v zelenjavi in okrasnih rastlinah. Parazitira tudi tobakovega ščitkarja (*Bemisia spp.*). Odrasli osebki - samice, so zelo majhne s temnim prsnim košem in svetlo rumenim trebuhom ter odložijo jajčece v ličinko ščitkarja. Ko se ličinka *E. formosa* izleže se razvija znotraj ščitkarja do konca cikla, ko nova odrasla oseba zapusti gostitelja tako, da naredi značilno okroglo luknjo. Parazitizirani puparije po približno 1-2 tednih dobi temnejšo barvo: popolnoma črno pri rastlinjakovem ščitkarju in rjavo lešnikovo pri *Bemisia spp.* *E. formosa* je izjemno učinkovita pri iskanju svojih gostiteljev.

### NAČIN UPORABE:

Enakomerno razporedite parazitirane bube, iz katerih se bodo izlegli odrasli osebki *Encarsia*. Pri temperaturah pod 15 °C in nad 30 °C je njihova aktivnost zmanjšana, zato so vmesne sezone ali klimatizirani rastlinjaki najboljše okolje za uporabo. Priporoča se tedenska aplikacija, 2-4 osebke/m<sup>2</sup> ob vsaki aplikaciji, dokler se ne doseže skupno 15-25 osebkov na m<sup>2</sup>.

**GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:** zelenjadnice, jagodičevje, okrasne rastline

**DOVOLJENA UPORABA:** V zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

2-4 osebke / m<sup>2</sup>  
ob vsaki aplikaciji



#### TRGOVSKO IME

EnPAK3000

EnPAK15.000



#### PAKIRANJE

Plastenka s 3000  
parazitiranimi bubami bele  
muhe oz. izleženimi odraslimi  
osebki.

Plastenka s 15.000



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti  
na hladnem pri najmanj 10 °C  
in ga uporabite takoj  
ali najkasneje  
v 24 urah.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Macrolophus pygmaeus*  
mehkokožna plenilka

odrasel osebek:

### CILJNI ORGANIZEM

rastlinjakov ščitkar  
(*Trialeurodes vaporariorum*)  
in tobakov ščitkar  
(*Bemisia spp.*) in  
paradižnikov molj  
(*Tuta absoluta*)



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

*Macrolophus pygmaeus* ima podolgovato 2-11 mm dolgo telo. Odrasli osebki so zelene barve s črno črto pri očeh. Črne so tudi začetni deli anten.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

*Macrolophus pygmaeus* je plenilec, ki je zelo razširjen v sredozemlju in se uporablja za biotično varstvo paradižnika. Vsi stadiji so zelo mobilni in lahko plenijo vse oblike ščitkarja (jajčeca, ličinke, odrasle osebke). Lahko se hrani tudi z listnimi ušmi, pršicami, ličinkami listnih zavrtalk in jajčeci paradižnikovega molja, kar omogoča dobro naselitev tudi v odsotnosti ščitkarja. Tega plenilca je zato treba naseliti zgodaj, tudi če je prisotnost ščitkarja minimalna, da lahko čim bolj omejimo njegov razvoj v posevku.

### NAČIN UPORABE:

Enakomerno razporedite žuželke neposredno po vegetaciji na več mestih. Odrasli osebki so dobro mobilni in spretni letalci, zato se hitro razporedijo po okoliških rastlinah.

**GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:** paprika, jajčevac, kumare, paradižnik, jagoda, okrasne rastline

**DOVOLJENA UPORABA:** V zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

100 osebkov/ 20-30 m<sup>2</sup>



#### TRGOVSKO IME

MiriPAK500



#### PAKIRANJE

Plastenka - 500  
odraslih osebkov



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti  
na hladnem pri najmanj  
10 °C in ga uporabite  
takoj ali najkasneje  
v 24 urah.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Adalia bipunctata*  
dvopika polonica

odrasel osebek:

## CILJNI ORGANIZEM

listne uši Aphididae



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

Imago *Adalie bipunctate* prezimi pod rastlinskimi ostanki tistih rastlin, kjer se je vrsta hranila in razvijala. Hrošči prezimijo pogosto tudi v hišah. Že zgodaj spomladi prilezejo iz prezimovališča, da jih opazimo na okenskih šipah. Spomladi, ko temperatura zraka doseže 15 do 20° C tudi sicer postanejo polonice aktivne. Po parjenju samice odložijo do 400 jajčec. Razvoj ličink poteka skozi stadije L1 do L4 podobno kot pri sedempikčasti polonici. Že po 10 do 15 dneh, zaužijejo 350 do 400 listnih uši, dorastejo in se zabubijo. Poletne generacije se pojavijo junija, samice pa odložijo do 900 jajčec. Celoleten razvoj od jajčeca do imaga traja 14 do 24 dni. Dvopika polonica živi na drevju nad 2 m višine, kjer se lahko hrani zlasti z ušmi v sadovnjakih in na drevju ter grmovju v urbanem prostoru. *Aphis pomi* zmanjša plodnost samic, ki se hranijo s to vrsto uši, prav nasprotno pa je če se polonica hrani z vrsto *Dysaphis plantaginea*.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

*Adalia bipunctata* je močan in učinkovit plenilec številnih vrst listnih uši. Sicer pa so esencialne uši za to vrsto polonice: *Acyrtosiphum pisum*, *Aphis pomi*, *Hyalopterus pruni*, *Myzus persicae*, *Rhopalosiphum maidis* in *R. padi*, na koruzi, kjer vrsto *A. bipunctata* občasno najdemo. Zaviralno delujejo na razvoj polonice uši: *Aphis fabae*, *Brevicoryne brassicae*. Najbolj toksična vrsta uši za dvopiko polonico je *Megoura viciae*.

### NAČIN UPORABE:

Odrasli osebki lahko zaužijejo tudi 100 listnih uši na dan. Ker potrebujejo veliko plena, se jih ne sprošča preventivno, marveč ob pojavu škodljivca. Ko škodljivcev zmanjka se preselijo na druge pridelke. Ker je aktivna že ob zmernih temperaturah se uporablja spomladi.

**GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:** Predvsem drevesne vrste

**DOVOLJENA UPORABA:** V zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

5-10 odraslih osebkov na rastlino, odvisno od številčnosti listnih uši in velikosti rastline



#### TRGOVSKO IME

Ada 30  
Ada 100  
Ada 250



#### PAKIRANJE

30 odraslih osebkov  
100 odraslih osebkov  
250 odraslih osebkov



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti na hladnem pri najmanj 10 °C in ga uporabite takoj ali najkasneje v 24 urah.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Exochomus  
quadripustulatus*  
plenilska polonica

odrasel osebek:

### CILJNI ORGANIZEM

volnate uši Adelgidae,  
kaparji Coccoidea, listne  
uši Aphididae



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

*Exochomus quadripustulatus* je 3 – 5 mm velika polonica črne barve z 2-4 znamenji, od katerih sta sprednji dve v obliki vejice. Znamenja so od rumeno, oranžne do rdeče barve. Ličinka v četrti stopnji razvoja L4 je siva z bodičastimi ščetinami. Buba je črna in sijoča z rjavimi oznakami na prsnem predelu.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

Borova polonica se hrani polifagno, z različnimi vrstami kaparjev, volnatih uši in uši, kot sta na primer zelena jablanova uš in krvava uš. Odrasla polonica pleni predvsem nimfe, lahko pa napada tudi odrasle osebkke. Kot pri drugih vrstah polonic so tudi ličinke borove polonice učinkoviti plenilci.

### NAČIN UPORABE:

Odrasle osebkke izpustimo čim bližje kolonij uši ali kaparjev, zato da jim omogočimo čim hitrejši stik s škodljivcem. Ob napadu škodljivcev na visokih drevesih, *Exochomus quadripustulatus* izpustimo na debela. Priporočljivo je izpuščanje, ko temperature presežejo 15°C.

**GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:** Sadno drevje in okrasne rastline

**DOVOLJENA UPORABA:** na prostem in v zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

Uporablja se lokalno na najbolj okuženih drevesih. Priporočena količina izpusta je do 500 osebkov na ha.



#### TRGOVSKO IME

MUX20  
MUX100



#### PAKIRANJE

Plastenka - 20 odraslih osebkov  
Plastenka - 100 odraslih osebkov



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti na hladnem pri najmanj 10 °C in ga uporabite takoj ali najkasneje v 24 urah.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Aphidius ervi*  
parazitoid

odrasel osebek:

## CILJNI ORGANIZEM

listne uši Aphididae



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

*Aphidius ervi* je pogost parazitoid listnih uši iz številnih rodov, vključno z *Macrosiphum*, *Aulacorthum*, *Acyrtosiphon* in drugimi. Odrasel stadij meri 4-5 mm ter ima črnkasto telo z dolgimi antenami, značilnimi za družino. *Aphidius ervi* je samotarski parazitoid, za katerega je značilno da celotni larvalni cikel poteka znotraj listne uši.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

*Aphidius ervi* odloži jajčece v listno uš, ki jo nato od znotraj počasi požre mlada rastoča ličinka. Telo listne uši nabrekne in se spremeni v tako imenovano mumijo, iz katere se izleže nov odrasel *Aphidius*, ki poišče nove žrtve. Zaradi visoke zmogljivosti iskanja in parazitiranja je *Aphidius ervi* zelo zanimiv tudi pri nizki pojavnosti škodljivcev.

### NAČIN UPORABE:

Najbolje jih je naseliti preventivno v začetnih fazah v obdobju ko se pričakuje pojav listnih uši. V primeru, da so uši že prisotne je smiselno naselitev parazitoida kombinirati z drugimi plenilci kot sta *Aphidoletes* ali *Chysoperla*. Enakomerno porazdelite mumije neposredno na vegetacijo.

### GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:

krompir, ječmen, pšenica, koruza, jagodičevje, jabolana, korenovke, druge rastlinske vrste

**DOVOLJENA UPORABA:** na prostem in v zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

Priporočena količina izpusta je 250 osebkov na 100m<sup>2</sup>.



#### TRGOVSKO IME

ErviPAK250



#### PAKIRANJE

Plastenka - 250 odraslih osebkov in mumij



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti na hladnem pri najmanj 10 °C in ga uporabite takoj ali najkasneje v 24 urah.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Aphidoletes aphidimyza*  
plenilska hrčica

odrasel osebek:

## CILJNI ORGANIZEM

listne uši Aphididae



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

*Aphidoletes aphidimyza* je pogost plenilec listnih uši, kot so *Aphis gossypii*, *Myzus persicae* in mnogih drugih vrst. *Aphidoletes* je zaradi njegove biologije vedno treba vnesti pravočasno, vsekakor pa ob prisotnosti kolonij listnih uši. Njegova uporaba je lahko odlična dopolnitev biološkega zatiranja s parazitoidi rodu *Aphidius*, ki so aktivni že pri zelo nizki gostoti. *Aphidoletes* ustrezajo zmerne temperature, ko najnižje temperature ostanejo stalno nad 15 °C, torej od pomladi do jeseni oz. v rastlinjakih.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

Odrasli osebki *Aphidoletes* se pariyo na različnih podlagah, vključno s pajkovimi mrežami, po katerih se zaradi svojih dolgih okončin lahko premikajo, ne da bi se vanje zapletle. Oplojene samice poiščejo kolonije listnih uši, v bližini katerih odložijo eno ali več jajčec, odvisno od gostote kolonije. Ličinke značilno oranžne barve so črvičaste in slabo mobilne, vendar lahko uničijo vse listne uši v bližini. Čeprav za svoj razvoj potrebujejo cca. 7 uši, jih pojejo do 80, pokončajo pa še veliko več. Razvoj je končan v približno desetih dneh, nato se ličinke spustijo na tla, kjer se zabubijo in prekrijejo z delci zemlje.

### NAČIN UPORABE:

Embalaža vsebuje ličinke iz katerih se v tednu dni izležejo odrasli osebki. Ličinke, ki so razporejene v inertnem materialu v plastenkah je potrebno enakomerno razporediti po priloženih posodah (10kos). Če so tla vlažna in ni nevarnosti plenjenja mravelj, jih lahko razporedite neposredno po tleh. Ličinke je potrebno do izleganja vlažiti. Odrasli osebki so dobro mobilni in hitro najdejo plen.

### GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:

krompir, ječmen, pšenica, koruza, jagodičevje, jabolana, korenovke, druge rastlinske vrste

**DOVOLJENA UPORABA:** na prostem in v zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

Priporočena količina izpusta  
so 2-4 osebki na m<sup>2</sup>.



#### TRGOVSKO IME

Mizapak1000

Mizapak2000



#### PAKIRANJE

Plastenka s  
1000 ličinkami.

Plastenka s  
2000 ličinkami.



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti  
na hladnem pri najmanj 10 °C  
in ga uporabite takoj  
ali najkasneje  
v 24 urah.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Sphaerophoria rueppelli* in  
*Episyrphus balteatus*  
Muhe trepetalke

odrasel osebek:

**CILJNI ORGANIZEM**  
listne uši Aphididae



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

Muhe trepetalke iz rodov *Episyrphus balteatus* in *Sphaerophoria rueppellii* so plenilci listnih uši. So manjše od 1cm, ter so značilno rumenočrno obarvane v odrasli dobi. Ličinke so črvom podobne, belozelenkaste barve. Nimajo nog vendar so zelo dobro mobilne. Odrasli osebki so dobri opraševalci.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

Odrasli so odlični letalci, ki se v prvih dneh hranijo s cvetnim prahom in nektarjem, nato pa začnejo odlagati jajčeca v bližino kolonij listnih uši. V nekaj tednih jih odložijo do 3500. Ličinke so zelo požrešne in lahko pojejo do 400 listnih uši. Trepetalke so aktivne pri zelo širokem razponu temperatur od hladnih do vročih, vendar se *Episyrphus balteatus* priporoča pri povprečnih temperaturah pod 20 °C in *Sphaerophoria rueppellii* pri temperaturah nad 20 °C.

### NAČIN UPORABE:

Ker se mlade muhe trepetalke hranijo s cvetnim prahom je potrebno zagotoviti rastline s cvetovi. Priporoča se setev medovitih rastlin, kot je obrežna krpnica/grobeljnik (*Lobularia maritima/Alyssum*), nekaj tednov pred naseljevanjem posejte 50-100 rastlin/hektar. Ličinke razdelite v več lončkov in jih razporedite na zaščitena mesta pred neposredno sončno svetlobo med posevek.

**GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:** zelenjadnice (kumare, paprika, jajčevec, jagode) in okrasne rastline

**DOVOLJENA UPORABA:** na prostem in v zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

Na začetku sezone 300-400 osebkov na hektar, ter v ponovitvah 200-300 osebkov na hektar vsake 2-3 tedne, odvisno od okoljskih dejavnikov.



#### TRGOVSKO IME

BALTO100  
SFERA100



#### PAKIRANJE

100 ličink  
100 ličink



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti na hladnem pri najmanj 10 °C in ga uporabite takoj ali najkasneje v 24 urah.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Chrysoperla carnea*  
Navadna tenčičarica

odrasel osebek:

## CILJNI ORGANIZEM

listne uši Aphididae



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

Odrasli osebek navadne tenčičarice je 12-20 mm dolg, z dolgimi antenami in svetleče zlatimi očmi. So aktivni letalci, posebej v večernih urah in ponoči. Jajčeca ovalne oblike so na začetku zelene barve, po nekaj dneh se obarvajo sivo. Ličinke sivorjave barve so izjemno aktivne in iz plenu sesajo telesne tekočine. Ličinke so na začetku manjše kot 1mm in nato zrastejo na 6-8 mm.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

*Chrysoperla carnea* je zelo pogost plenilec številnih vrst listnih uši, prisotnih na vrtninah (papriki, jagodah, jajčevcih,...), okrasnih rastlinah in poljščinah. Samo trije stadiji ličinke z značilnimi kleščastimi ustnimi deli so aktivni plenilci. Odrasli osebki se prehranjujejo s cvetnim prahom, nektarjem in drugimi sladkimi snovmi. Ličinke so zelo požrešne in se lahko takoj prehranjujejo s plenom, predvsem listnimi ušmi, pa tudi drugimi škodljivci kot so pršice, jajčeca metuljev, resarji, rastlinjakovim ščitkarjem in drugimi majhnimi žuželkami.

### NAČIN UPORABE:

Ličinke, ki so razporejene v inertnem materialu raztresemo po vegetaciji, pri čemer pazimo, da ne padejo na tla. Poskusimo razporediti na najbolj okužena območja.

### GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:

paprika, jagode, jajčevci, okrasne rastline, krompir, ječmen, pšenica, koruza, jagodičevje, jabolana, korenovke in druge rastlinske vrste.

**DOVOLJENA UPORABA:** na prostem in v zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

500 ličink na 20-30 na m<sup>2</sup>.  
Manjše količine so učinkovite  
za inokulacijo tega učinkovitega  
plenilca.



#### TRGOVSKO IME

CrisoPAK1000

Criso10000



#### PAKIRANJE

Plastenka s  
1000 ličinkami.

Plastenka s  
10.000 ličinkami.



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti  
na hladnem pri najmanj 10 °C  
in ga uporabite takoj  
ali najkasneje  
v 24 urah.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Propylea  
quatuordecimpunctata*  
plenilska polonica

odrasel osebek:

## CILJNI ORGANIZEM

listne uši Aphididae



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

*Propylea quatuordecimpunctata* je 4-6 mm velika pikapolonica rumeno črne barve z vzorcem podobnim šahovnici. Ličinke s vitke sivorumene s črnimi pikami. Samice izležejo 4-15 ovalnih zelenih jajčec na liste ali stebela. Jajce se izleže v ličinko po cca 8-10 dneh in se zabubi na listih ali stebelu. Odrasel osebek se izleže po 4-5 dneh. Prezimi kot odrasel osebek pod odpadlim listjem.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

*Propylea quatuordecimpunctata* je majhna pikapolonica, ki je zelo pogosta v evropskih habitatih. Prehranjuje se predvsem z listnimi ušmi tako v fazi ličinke kot odraslih osebkov. Za razliko od podobnih vrst je primerna za naselitev, ko plen še ni številčen in deluje preventivno pri nizki gostoti. Če kolonije listnih uši postanejo številčnejše, se lahko odzovejo s hitrim razmnoževanjem in ustvarijo večjo populacijo. Zaradi te prilagodljivosti obnašanja je posebej primerna za preventivno uporabo v posevkih kjer je gospodarski prag škode nizek. Predvsem v rastlinjakih, v posevkih paprike, jajčevcev, melon, kumar in drugih.

### NAČIN UPORABE:

Odprite plastenko in odrasli osebki bodo izšli iz plastenke.

### GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:

paprika, jajčevci, melone, kumare, okrasne rastline, krompir, ječmen, pšenica, koruza, jagodičevje, jabolana, korenovke in druge rastlinske vrste.

**DOVOLJENA UPORABA:** na prostem in v zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

Ob zgodnji aplikaciji je populacija naselitve lahko majhna, ob izbruhu pa se odmerek na prizadetih rastlinah poveča na 5-10 osebkov/rastlino.



#### TRGOVSKO IME

Lea50

Lea250



#### PAKIRANJE

Plastenka - 50 odraslih osebkov

Plastenka - 250 odraslih osebkov



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti na hladnem pri najmanj 10 °C in ga uporabite takoj ali najkasneje v 24 urah.

Zapiski:



## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Anthocoris nemoralis*  
cvetna stenica

odrasel osebek:

## CILJNI ORGANIZEM

mala hruševa bolšica  
(*Cacopsylla pyricola*)



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

*Anthocoris nemoralis* prezimuje kot odrasel osebek na zaščitenih lokacijah, zavetje najde v razpokah lubja, odmrlem lesu ali odmrlem listju. Spomladi, ko temperatura pogosto presega 10°C, samica začne odlagati jajčeca na prvo zeleno vegetacijo (liste ali brste). Jajca izleže v tkiva pod povrhnjico. Prva generacija ličink se začne razvijati tako, da jedo majhne bolšice (jajca in ličinke). Obstaja pet stadijev ličink in tri generacije na leto. Ta vrsta lahko zelo dobro preživi s plenjenjem drugih škodljivcev, kot so: listne uši, molji, pršice in drugi.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

*Anthocoris nemoralis* je močan in učinkovit plenilec male hruševe bolšice (*Cacopsylla pyricola*). Je polifagni plenilec, ki ga lahko najdemo v številnih pridelkih ali divjih rastlinah, razen v nasadih hrušk.

### NAČIN UPORABE:

Najbolje jih je sprostiti pomladi. Hrošči so zelo mobilni in lahko zelo dobro letijo, tako da je za dobro razpršenost dovolj 5-6 izpustnih točk na hektar. Osnovni cilj programa sproščanja je vzpostaviti populacijo plenilcev ki je višja od običajne, kar zmanjša potrebo po kemičnem zatiranju.

### GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA: hruška

### DOVOLJENA UPORABA: na prostem



#### ODMEREK

Priporočena količina izpusta je okoli 2.000-3.000 odraslih osebkov na hektar.



#### TRGOVSKO IME

Anthopak500



#### PAKIRANJE

500 odraslih osebkov



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti na hladnem pri najmanj 10 °C in ga uporabite takoj ali najkasneje v 24 urah.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Trichogramma brassicae*  
parazitoid

Kapsule, ki vsebujejo  
parazitirana jajčeca  
koruzne veščice in drugih  
vrst (Lepidoptera) v  
različnih fazah razvoja

## CILJNI ORGANIZEM

koruzna veščica  
(*Ostrinia nubilalis*)



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

Jajčeca iz rodu *Trichogramma* so prosojna. Njihov premer je 0,04 mm, v dolžino pa merijo 0,14 mm. Po 24 urah se razvije ličinka, ki ima srpato oblikovane čeljusti. Ličinka poje vso vsebino jajčeca gostitelja. Samica navadno parazitira sveže odložena jajčeca. Ličinke se štirikrat levijo, nato se zabubijo. Pri tem jajčece gostitelja počrni. Bube so svetle. Malo pred izvalitvijo odraslega osebkca se na zadku pojavijo črte. Izvalitev odrasle žuželke se navadno zgodi v jutranjem času. Samice merijo v dolžino 0,6 mm. Njihova glava in oprsje sta črna. Na razvojni krog in sposobnost parazitiranja parazitoidne ose *T. brassicae* ima pomemben vpliv temperatura. Razvojni krog od jajčeca do odraslega osebkca traja 10 - 12 dni (23-25°C). Ustrezne gostitelje išče *T. brassicae* od tal proti vrhu rastline. Najvišja temperatura, pri kateri razvoj še poteka, je 38°C. V večja jajčeca pa lahko samica odloži več jajčec, lahko tudi do 30. V enem jajčecu gostitelja pride lahko do razvoja obeh spolov vrste *T. brassicae*. Parazitirana jajčeca postanejo pri 24°C črna po 4 dneh. Odlaganje jajčec samic *T. brassicae* je najbolj intenzivno v prvih dveh dneh po izletu iz gostitelja. Razmerje v spolih po izvalitvi je v prid samic. V jajčece iz družine sovok (Noctuidae) parazitoidna osa odloži 2-3 svoja jajčeca.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

*Trichogramma brassicae* je parazitoid jajčec koruzne veščice (*Ostrinia nubilalis*). Koruzna veščica povzroča škodo v koruzi, hmelju, papriki ter drugih posevkih.

### NAČIN UPORABE:

Kapsule vsebujejo parazitirana jajčeca v različnih fazah razvoja, ki se v obdobju treh tednov razvijejo do odraslega osebkca. Uporablja se ob pojavu koruzne veščice. Kapsule enakomerno razporedite po zemljišču bodisi s tal ali iz zraka z dronom, ki ima nameščen posebni aplikator.

**GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:** Koruza, hmelj, paprika in druge rastlinske vrste

**DOVOLJENA UPORABA:** na prostem in v zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

450.000 osebkov  
na hektar



#### TRGOVSKO IME

VIS



#### PAKIRANJE

Plastenka - 450.000 osebkov v  
obliki kapsul.  
V eni kapsuli je večje število  
osebkov.



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti  
na hladnem pri najmanj 10 °C  
in ga uporabite takoj  
ali najkasneje  
v 24 urah.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Diglyphus isaea*  
parazit zavrtačev

odrasel osebek:

## CILJNI ORGANIZEM

listne zavrtačke iz rodu  
*Liriomyza*



### BILOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

Odrasel osebek *Diglyphus isaea* je črn, z zelenimi kovinskimi sijajem, dolg nekaj milimetrov ter kratkimi antenami. Samice, raziskujejo površino listov ter iščejo ličinke listnih zavrtačk. Ko je vanje izleženo jajčece, paralizirane predstavljajo hrano za razvoj ličink. Ko ličinke dozori, se v zavrtački zabubijo, na koncu metamorfoze se iz lista pojavi nov odrasel osebek, ki v povrhnjici naredi okroglo luknjo. Vsaka samica odloži od 60 do 100 jajčec, vendar je izjemno pomembna tudi plenilska dejavnost samic (hranjenje gostitelja), saj povzroča dodatno smrtnost v populacijah listnih zavrtačk.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

*Diglyphus isaea* je parazitoid, značilen za sredozemska okolja in je zelo učinkovit pri zatiranju listnih zavrtačk iz rodu *Liriomyza*. Zaradi svoje odpornosti in enostavne uporabe je široko uporaben v programih varstva paradižnika, jajčevcev, zelenjave, okrasnih rastlin in drugih poljščin, tako v rastlinjakih kot tudi na prostem. Čeprav se lahko uporablja v že okuženih posevkih, je priporočljiva zgodnja uporaba. Najboljša je večkratna aplikacija v nizkih količinah. Izjemna iskalna sposobnost in mobilnost parazitoida omogočata hitro kolonizacijo posevka.

**NAČIN UPORABE:** Odprite plastenko in odrasli osebki bodo izšli iz plastenke.

**GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:** predvsem listna zelenjava

**DOVOLJENA UPORABA:** na prostem in v zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

250 osebkov na 150-200 m<sup>2</sup>  
oz. večkratna aplikacija v nizkih  
odmerkih dokler se ne doseže  
0,5-2 osebka/m<sup>2</sup>



#### TRGOVSKO IME

DiglyPAK250



#### PAKIRANJE

Plastenka - 250  
odraslih osebkov



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti  
na hladnem pri najmanj 10 °C  
in ga uporabite takoj  
ali najkasneje  
v 24 urah.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Anastatus bifasciatus*  
Parazitoidna osica

odrasel osebek:

## CILJNI ORGANIZEM

marmorirana smrdljivka  
(*Halyomorpha halys*)



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

*Anastatus bifasciatus* je evropska vrsta, ki je prisotna v različnih habitatih. Samice živijo dva meseca, hranijo se z nektarjem in medeno roso ter odložijo do 50 jajčec. Nasprotno manjši samci živijo le nekaj dni, ko se pojavijo. Samice se lahko hranijo tudi z jajčeci hroščev s tako imenovanim gostiteljskim hranjenjem, ki pomembno prispeva k biološkemu nadzoru nad škodljivci. Sredstvo je primerno za uporabo v nasadih sadnega drevja, zelenjave in oljne ogrščice.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

*Anastatus bifasciatus* je plenilec za zatiranje škodljivcev, zlasti iz reda stenic, metuljev in vešč. Je polifagni plenilec, ki lahko se lahko hrani tudi z marmorirano smrdljivko (*Halyomorpha halys*). To omogoča stabilno naselitev v mnoge posevke. Vrsta je zato posebej primerna za preventivno naselitev ob odsotnosti najbolj značilnega plena.

### NAČIN UPORABE:

Uporablja se od pozne pomladi do konca poletja. Osnovni cilj programa sproščanja je vzpostaviti populacijo plenilcev, ki je višja od običajne. Priporočljiv je izpust tudi na vegetacijo v neposredni bližini nasada.

**GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:** Sadno drevje, zelenjava, oljna ogrščica

**DOVOLJENA UPORABA:** na prostem



#### ODMEREK

Pri tej vrsti ni natančnega odmerka uporabe, saj vsak minimalen vnos pripomore k postopnemu ustvarjanju naravnega ravnovesja. Priporočena količina izpusta je 1000 osebkov/ha.



#### TRGOVSKO IME

Aly250



#### PAKIRANJE

Plastenka - 250  
odraslih osebkov



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti na hladnem pri najmanj 10 °C in ga uporabite takoj ali najkasneje v 24 urah.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Trissolcus basalis*  
Parazitoid

odrasel osebek:

## CILJNI ORGANIZEM

zelena smrdljivka  
(*Nezara viridula*)



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

*Trissolcus basalis* je dolg en milimeter in črne barve, lahko parazitira različne škodljivce. Samica odloži jajčeca v notrajost gostitelja. Ličinka parazitoida se v jajčecu škodljivca razvije do odraslega stadija. Vsaka samica živi približno nekaj tednov in ima visoko sposobnost iskanja plena. V času 2 tednov odloži do 250 jajčec. Pri optimalni temperaturi 27°C se cikel izvede v približno desetih dneh.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

*Trissolcus basalis* je parazitoid zelene smrdljivke (*Nezara viridula*). Jajčeca škodljivca se ob parazitiranju obarvajo sivkasto. Uporabljamo ga od meseca junija dalje oz. nemudoma ob pojavu škodljivca na posevku.

### NAČIN UPORABE:

Uporablja se od junija naprej oz. takoj ob pojavu zelene stenice na posevku. Plastenka vsebuje 500 odraslih osebkov, papirnate trakove ter glukozo. Platenko odprite in parazitoide izpustite na več mestih v posevku.

### GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:

Zelenjadnice (paradižnik, paprika, jajčevci, ..) hmelj, koruza, žita in ostale rastlinske vrste

**DOVOLJENA UPORABA:** na prostem in v zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

Priporočena količina na izpust je  
0,5-1 osebek/m<sup>2</sup>.  
Ob prisotnosti škodljivca  
se izpuste ponavlja na 1-2 tedna.



#### TRGOVSKO IME

BASE500



#### PAKIRANJE

Plastenka - 500  
odraslih osebkov



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti  
na hladnem pri najmanj 10 °C  
in ga uporabite takoj  
ali najkasneje  
v 24 urah.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Trichopria drosophilae*  
Parazitoidna osica

odrasel osebek:

## CILJNI ORGANIZEM

Plodova vinska mušica  
(*Drosophila suzukii*)



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

Parazitoidna osica *Trichopria drosophilae* je naravno prisotna v habitatih na območju Evrope, kjer se je naučila izkoriščati ličinke nevarnega škodljivca – plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*) kot gostitelja za izleganje jajčec. Samica *Trichoprie drosophilae* poišče ličinke plodove vinske mušice, ter vanje izleže svoje jajčece in jih s tem takoj ubije. Znotraj žrtev se v treh tednih razvije odrasla parazitoidna osica, ki izvrtla luknjo in izleti iskat nove žrtve. Vsaka samica izleže cca. 100 jajčec.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

Plodova vinska mušica (*Drosophila suzukii*) spada v družino vinskih mušic oziroma drozofil (*Drosophilidae*), za katere je značilno, da jih privablja vonj sadežev in tekočin, v katerih poteka proces fermentacije. Odrasla plodova vinska mušica prezimi v različnih skrivališčih in spomladi postane aktivna, ko je dosežena temperatura zraka nad 10 °C. Letno lahko razvije več kot 10 rodov.

Obvladovanje plodove vinske mušice je problematično, saj samica odlaga jajčeca v zrele oziroma dozorevajoče plodove tik pred obiranjem. V času pred dovzetnostjo pridelka za napad plodove vinske mušice je pomembno vzpostaviti populacijo parazitoidne osice *Trichopria drosophilae*, saj ta z načinom parazitiranja omeji razvoj škodljivca in s tem zmanjša gospodarsko škodo na pridelku.

### NAČIN UPORABE:

Odrasle osebkke parazitoidne osice *Trichopria drosophilae* in parazitirane ličinke plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*) posujemo po tleh med rastlinami. Izpuščanje se izvaja od maja do septembra v več ponovitvah v razmaku 2 tednov.

### GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA:

Koščičarji (češnje, višnje, breskve, marelice), jagodičevje (maline, robide, ameriške borovnice, jagode, aronija), vinska trta ter figa

**DOVOLJENA UPORABA:** Na prostem in v zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

Priporočena količina je 500-1000 osebkov/ha.  
Priporočenih je 8-10 aplikacij v razmaku 2 tednov.  
Odvisno od vrste rastline in občutljivosti se odmerek prilagodi.



#### TRGOVSKO IME

Trichopria500

TrichopriaV\*

\*\*\*za aplikacijo z dronom



#### PAKIRANJE

500 odraslih osebkov in parazitiranih ličink plodove vinske mušice

5000 parazitiranih ličink plodove vinske mušice



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Izdelek je treba hraniti na hladnem pri najmanj 10 °C in ga uporabite takoj ali najkasneje v 24 urah.

Zapiski:


## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Heterorhabditis  
bacteriophora*  
entomopatogena  
ogorčica

odrasel osebek:

## CILJNI ORGANIZEM

ličinke lucerninega jajčastega  
rilčkarja (*Otiorhynchus ligustici*)  
in ličinke ostalih hroščev,  
ki se hranijo s koreninami



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

Entomopatogene ogorčice *Heterorhabditis bacteriophora* so majhni, črvom podobni organizmi, ki živijo v tleh na račun ličink. Ogorčice prodrejo v svoje žrtve skozi odprtine v telesu ali celo aktivno preko površino ličinke. Ko ogorčica vstopi v gostitelja, sprosti simbiotske mikroorganizme, ki se razmnožijo in povzročijo smrt ličinke v 24-72 urah. Umrle ličinke postanejo rumeno-rjave ali rdečkaste, odvisno od vrste. Dejavnost mikroorganizmov spremeni notranjost ličinke v idealen substrat za razmnoževanje ogorčice. Ko ogorčica opravi enega do dva razmnoževalna kroga, proizvede na tisoče novih ogorčic, ki zapustijo truplo ličinke, ter poiščejo nove ličinke.

Ogorčice so zelo učinkovite pri zatiranju več pomembnih vrst žuželk, ter popolnoma neškodljive za neciljne vrste in sesalce, zato predstavljajo pomembno skupino biotičnih sredstev za varstvo rastlin.

Uporaba je enostavna, saj se sredstvo raztopi v vodi in nato nanese na ciljno površino.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

Entomopatogene ogorčice so naravno prisotne v tleh, kjer živijo na račun ličink žuželk, ki prodrejo in povzročijo njihovo smrt. Ubita žuželka nato postane primeren substrat za njihovo razmnoževanje in posledično razmnoževanje, s tisoči novih ogorčic, ki se sprostijo v tleh, kar sproži nadaljnji nadzor. Idealne temperature substrata za večjo učinkovitost so 18-22 °C (najmanj 13 - največ 30 °C).

*Heterorhabditis bacteriophora* je entomopatogena ogorčica, ki se uporablja za biotično varstvo zoper ličinke lucerninega rilčkarja, ter ličinke drugih hroščev, ki se prehranjujejo s koreninami rastlin in kot odrasli osebkji jedo liste oz. druge dele rastlin.

Učinkovit deluje le na ličinke hroščev v tleh. Čas tretiranja prilagodite biološkemu ciklu škodljivca.

### NAČIN UPORABE:

Sredstvo vmešajte v mlačno vodo, ter z raztopino zalijte tla oz. sadike. Za zatiranje lucerninega rilčkarja je najprimernejši termin aplikacije september-oktober, ko je v tleh največ ličink. To pomeni tudi, da bo več ličink okuženih. Koristno je, da se aplikacija ponovi spomladi, ko ličinke pridejo bližje površin in preden se zabubijo (konec maja). Pomladansko tretiranje se izvede, ko je temperatura tal nad 13-15°C.

**DOVOLJENA UPORABA:** na prostem in v zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

Do 500 tisoč na m<sup>2</sup>.  
Nemopak HB za 100 - 200 m<sup>2</sup>.  
Nemopak HB 500 za  
površino 2.000 m<sup>2</sup>.



#### TRGOVSKO IME

NEMOPAK HB  
NEMOPAK HB 500



#### PAKIRANJE

Škatla - 50 mio ličink  
Škatla - 500 mio ličink



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Hranite pri temperaturi 4-10°C.  
Uporabite v 10 dneh po dostavi.  
V vsakem primeru pa do roka  
uporabnosti, navedenega  
na embalaži.

Zapiski:

## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Steinernema carpocapsae*  
entomopatogena ogorčica

odrasel osebek:

### CILJNI ORGANIZEM

ličinke jabolčnega zavijača (*Cydia pomonella*),  
bramor (*Gryllotalpa gryllotalpa*), ličinke  
sadnega koreninarja (*Capnodis tenebrionis*),  
ličinke pušpanove vešče (*Cydalima  
perspectalis*), ličinke kapusovega  
košeninarja (*Tipula oleracea*), ličinke  
travniškega komarja (*Tipula paludosa*)



**BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:** Entomopatogene ogorčice *Steinernema carpocapsae* so majhni, črvom podobni organizmi, ki živijo v tleh na račun ličink. Ogorčice prodrejo v svoje žrtve skozi odprtine v telesu ali celo aktivno preko površino ličinke. Ko ogorčica vstopi v gostitelja, sprosti simbiotske mikroorganizme, ki se razmnožijo in povzročijo smrt ličinke v 24-72 urah. Umrle ličinke postanejo rumeno-rjave ali rdečkaste, odvisno od vrste. Dejavnost mikroorganizmov spremeni notranjost ličinke v idealen substrat za razmnoževanje ogorčice. Ko ogorčica opravi enega do dva razmnoževalna kroga, proizvede na tisoče novih ogorčic, ki zapustijo truplo ličinke, ter poiščejo nove ličinke. Ogorčice so zelo učinkovite pri zatiranju več pomembnih vrst žuželk, ter popolnoma neškodljive za neciljne vrste in sesalce, zato predstavljajo pomembno skupino biotičnih sredstev za varstvo rastlin.

Uporaba je enostavna, saj se sredstvo raztopi v vodi in nato nanese na ciljno površino.

**ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:** Entomopatogene ogorčice so naravno prisotne v tleh, kjer živijo na račun ličink žuželk, ki prodrejo in povzročijo njihovo smrt. Ubita žuželka nato postane primeren substrat za njihovo razmnoževanje in posledično razmnoževanje, s tisoči novih ogorčic, ki se sprostijo v tleh, kar sproži nadaljnji nadzor. Idealne temperature substrata za večjo učinkovitost so 18-22 °C (najmanj 13 - največ 30 °C).

**NAČIN UPORABE:** Tretiranje zoper jabolčnega zavijača (*Cydia pomonella*) se izvede v septembru/oktobru z nanosom na deblo do višine 1m, da se zadene ličinke pod lubjem, ki se pripravljajo na prezimovanje. Zatiranje zoper bramorja (*Gryllotalpa gryllotalpa*) se izvede od maja do septembra z nanosom na površino. Zatiranje zoper ličinke kapusovega košeninarja (*Tipula oleracea*) ter ličinke travniškega komarja (*Tipula paludosa*) se izvede pozno poleti proti mladim ličinkam. Zatiranje zoper pušpanovo veščo (*Cydalima perspectalis*) se izvede v večernem času z nanosom na grm.

**ODMEREK:** Zoper jabolčnega zavijača (*Cydia pomonella*) v odmerku 50mio/300m<sup>2</sup>. Zatiranje zoper bramorja (*Gryllotalpa gryllotalpa*) v odmerku 50 mio /100m<sup>2</sup>. Zatiranje zoper ličinke kapusovega košeninarja (*Tipula oleracea*) ter ličinke travniškega komarja (*Tipula paludosa*) se izvede pozno poleti proti mladim ličinkam. Zatiranje zoper pušpanovo veščo (*Cydalima perspectalis*) se izvede v večernem času z nanosom na grm.

**DOVOLJENA UPORABA:** na prostem in v zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

50 mio na 100-300 m<sup>2</sup>  
odvisen od vrste škodljivca,  
glej opis zgoraj



#### TRGOVSKO IME

NEMOPAK SC  
NEMOPAK SC 500



#### PAKIRANJE

Škatla - 50 mio ličink  
Škatla - 500 mio ličink



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Hranite pri temperaturi 4-10°C.  
Uporabite v 10 dneh po dostavi.  
V vsakem primeru pa do roka  
uporabnosti, navedenega  
na embalaži.

Zapiski:


## KORISTNI ORGANIZEM IN OBLIKA

*Steinernema feltiae*  
entomopatogena ogorčica

odrasel osebek:

### CILJNI ORGANIZEM

ličinke dvokrilcev (*Diptera*) kot so mrtvaške mušice (*Sciaridae*), Phoridae, listne zavrtalke (*Agromizidae*), prave muhe (*Muscidae*) in ličink metuljev (*Lepidoptera*) kot so sovke (*Noctuidae*), strune (*Agrotis*), lesne zavrtače (*Cossidae*), steklokrilci (*Sesiidae*)



### BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:

Entomopatogene ogorčice *Steinernema feltiae* so majhni, črvom podobni organizmi, ki živijo v tleh na račun ličink. Ogorčice prodrejo v svoje žrtve skozi odprtine v telesu ali celo aktivno preko površino ličinke. Ko ogorčica vstopi v gostitelja, sprosti simbiotske mikroorganizme, ki se razmnožijo in povzročijo smrt ličinke v 24-72 urah. Umrle ličinke postanejo rumeno-rjave ali rdečkaste, odvisno od vrste. Dejavnost mikroorganizmov spremeni notranjost ličinke v idealen substrat za razmnoževanje ogorčice. Ko ogorčica opravi enega do dva razmnoževalna kroga, proizvede na tisoče novih ogorčic, ki zapustijo truplo ličinke, ter poiščejo nove ličinke.

Ogorčice so zelo učinkovite pri zatiranju več pomembnih vrst žuželk, ter popolnoma neškodljive za neciljne vrste in sesalce, zato predstavljajo pomembno skupino biotičnih sredstev za varstvo rastlin.

### ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:

*Steinernema feltiae* je entomopatogena ogorčica, ki se uporablja za biotično varstvo za zatiranje ličink dvokrilcev (*Diptera*) kot so mrtvaške mušice (*Sciaridae*), Phoridae, listne zavrtalke (*Agromizidae*), prave muhe (*Muscidae*). Ta ogorčica v tleh čaka na gostitelja. Ko vstopi vanj, se sprosti simbiotsko bakterijo (*Xenorhabdus sp.*), njegova aktivnost povzroči smrt ličinke. Delovanje bakterije ustvari idealen substrat za razvoj na tisoče novih ogorčic, ki nato zapustijo truplo ličinke ter poiščejo nove gostitelje. Začetno hitro in učinkovito delovanje se sčasoma podaljša, da se ohranja razvojni krog. Nanos se izvaja s klasično opremo in je popolnoma varen za ljudi in rastline. Idealne temperature substrata za večjo učinkovitost so 15-20 °C (najmanj 10 - največ 30 °C).

### NAČIN UPORABE:

Sredstvo raztopite v mlačni vodi, ter pripravljeno raztopino nanesite na ciljno površino. Tretiranje se izvede pri temperatura tal višja od 12°C.

**DOVOLJENA UPORABA:** na prostem in v zavarovanih prostorih



#### ODMEREK

50 milijonov ogorčic  
za 80 - 150 m<sup>2</sup> oz.  
10-20.000 na liter zemlje



#### TRGOVSKO IME

NEMOPAK SF  
NEMOPAK SF 500



#### PAKIRANJE

Škatla - 50 mio ličink  
Škatla - 500 mio ličink



#### TRANSPORT IN HRANJENJE

Hranite pri temperaturi 4-10°C.  
Uporabite v 10 dneh po dostavi.  
V vsakem primeru pa do roka uporabnosti, navedenega na embalaži.

Zapiski:

# BIOTIČNO VARSTVO JAGOD

## Mikro biotično varstvo pred boleznimi



### POLYVERSUM

Sredstvo POLYVERSUM je preventivni kontaktni (dotikalni) fungicid na podlagi mikroorganizmov, ki vsebuje glivo *Pythium oligandrum M1*. Sredstvo deluje kot mikoparazit, ki z encimsko razgradnjo škodljivim talnim glivam jemlje kisik in hranila. Poleg tega poveča odpornost (rezistenco) s proizvodnjo beljakovin v celični steni in spodbuja rast gojenih rastlin preko tvorbe snovi triptamin (predhodnik fitohormona avksina), ki povečuje vnos fosforja in mikrohranil.

UPORABA PROTI	Latinsko ime	Doza / ha	Max. Št. tretiranj
Bela Listna pegavost	<i>Mycosphaerella fragariae</i>	0,1-0,2 kg	4
Rdeča listna pegavost	<i>Diplocarpon earliana</i>	0,1-0,2 kg	4
Gnomonijska gniloba	<i>Gnomonia fructicola</i>	0,1-0,2 kg	4
Siva plesen	<i>Botryotinia fuckeliana</i>	0,1-0,2 kg	4
Rdeča koreninska gniloba	<i>Phytophthora fragariae</i>	0,1-0,2 kg	1

### BOTECTOR



Sredstvo BOTECTOR je preventivni kontaktni fungicid na podlagi mikroorganizmov in vsebuje aktivno snov *Aureobasidium pullulans* (seva DSM 14940 in DSM 14941). Deluje tako, da gliva tekmuje (konkurira) za prostor in hranila s sivo plesnijo.

Odmerek 1 kg/ha, 6x v eni rastni dobi, zoper sivo plesen (*Botrytis cinerea*) od faze BBCH 61 (začetek cvetenja: približno 10% cvetov odprtih) do faze BBCH 89 (drugi pridelek: več plodov obarvanih).

BOTECTOR preprečuje skladiščne bolezni pri sadju z aplikacijami na polju pred spravilom.



## Biotično varstvo jagod

Čas je za prvi vnos biotičnega varstva zoper tripsa, pršico in uši v jagodah. Vnaša se ob prvem cvetenju in v primeru kemičnega tretiranja s fungicidi 3-4 dni po aplikaciji.



### 1. Doza na m<sup>2</sup> za TRIPSA:

1-2 osebkov *Orius majusculus* na m<sup>2</sup>, Na 1000m<sup>2</sup> = 1000 osebkov za prvi vnos in čez 14 dni ponovitev, (v kolikor ni plodov) če so plodovi, še ponovitev vnosa.

KORISTNI RGANIZMI	Enot v pakiranju	Pakiranje (EM)
OriusM500	500	1 platenka



### 1. Za PRŠICE:

25-40 *Amblyseuis andersonii* na m<sup>2</sup>, Na 1000m<sup>2</sup> = 25.000 osebkov za prvo aplikacijo in čez 14 dni ponovitev aplikacije.

KORISTNI RGANIZMI	Enot v pakiranju	Pakiranje (EM)
Anderpak	25000	1 vrečka
Andersak	125 000	1 vreča



### 1. Za UŠI:

za 1. vnos, ponovitev čez 14 dni. Kombinacija:  
0,25 – 0,5 osebkov *Aphidius ervi* na m<sup>2</sup>. Na 1000m<sup>2</sup> = 250 osebkov

KORISTNI RGANIZMI	Enot v pakiranju	Pakiranje (EM)
ErviPAK250	250	1 platenka



1 osebek *Aphidoletes aphidimyza* na m<sup>2</sup>. Na 1000m<sup>2</sup> = 1000 osebkov

KORISTNI RGANIZMI	Enot v pakiranju	Pakiranje (EM)
Mizapak1000	1000	1 platenka
Mizapak2000	2000	1 platenka

Svetujemo uporabo sredstva **AGRICOLE** direktno v kolonijo.

AGRICOLLE je sredstvo z mehanskim načinom delovanja. Vsebuje naravne polisaharide, ki ujamejo manjše insekte (uši, ščitkarji, pršice, hruševa bolšica in drugi) na listih ali substratu ter tako zmanjšajo njihovo številčnost. **Sredstvo nima ostankov, zato karencna ni potrebna.**

AGRICOLLE se uporablja na **paradižniku, papriki, kumarah, jagodah, jagodičevju, hruškah, drugem sadnem drevju, okrasnih rastlinah ter številnih ostalih vrstah rastlin.** Priporočen odmerek je 30mL/10L oz. 300mL/100L vode. Zaradi mehanskega načina delovanja je potrebna dobra pokritost listov s sredstvom. Tretiranje naredite zgodaj zjutraj ali zvečer, ko so škodljivci najmanj aktivni. Sredstva ne uporabljajte pri močnem soncu ter temperaturah nad 30 °C.

## BIOTIČNO VARSTVO HRUŠK

Čas je za prvi vnos biotičnega varstva zoper hruševo bolšico v nasadu hrušk. Vnaša se v začetku maja, 7-10 dni po prvem kemičnem tretiranju zoper hruševo bolšico.

### 1. Doza na ha:

1000-1500 osebkov *Anthocoris nemoralis* na ha za prvi vnos in čez cca 1 mesec ponovitev. Vse mobilne faze *Anthocoris nemoralis* so predatorji. Priporočene so 2-3 aplikacije letno, da razvije 2-3 generacije pred zimo.



KORISTNI RGANIZMI	Enot v pakiranju	Pakiranje (EM)
Anthopak500	500	1 platenka



Priporoča se tudi tretiranje s pripravkom AGRICOLLE, ki se uporablja na **hruškah, drugem sadnem drevju, okrasnih rastlinah ter številnih ostalih vrstah rastlin.** Uporaba je smiselna, ko je hruševa bolšica v stadiju jajčeca in ličinke. Priporočen odmerek je 30mL/10L oz. 300mL/100L vode. Zaradi mehanskega načina delovanja je potrebna dobra pokritost listov s sredstvom. Tretiranje naredite zgodaj zjutraj ali zvečer, ko so škodljivci najmanj aktivni. Sredstva ne uporabljajte pri močnem soncu ter temperaturah nad 30 °C.

# FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA NA PODLAGI MIKROORGANIZMOV



## BOTECTOR (WG)

Sredstvo BOTECTOR je preventivni kontaktni fungicid na podlagi mikroorganizmov in vsebuje aktivno snov *Aureobasidium pullulans* (seva DSM 14940 in DSM 14941). Deluje tako, da gliva tekmuje (konkurira) za prostor in hranila s sivo plesnijo.

Učinkovitost sredstva je primerljiva s kemičnimi pripravki, karenca pa je le 1 dan. Proti sivi plesni na jagodi, paradižniku, vinski trti in jagodičevju (manjše uporabe).



## POLYVERSUM (WP)

Sredstvo POLYVERSUM je preventivni kontaktni fungicid na podlagi mikroorganizmov, ki vsebuje glivo *Pythium oligandrum* M1. Sredstvo deluje kot mikoparazit, ki z encimsko razgradnjo škodljivim talnim glivam jemlje kisik in hranila. Poleg tega poveča odpornost (rezistenco) s proizvodnjo beljakovin v celični steni in spodbuja rast gojenih rastlin preko tvorbe snovi triptamin (predhodnik fitohormona avksina), ki povečuje vnos fosforja in mikrohranil. Sredstvo POLYVERSUM se uporablja za omejevanje nadaljnega širjenja različnih glivičnih bolezni in je registrirano za uporabo na mnogih različnih rastlinskih vrstah. Mešanje sredstva s fungicidi ni dovoljeno. Karenca je 1 dan oziroma zagotovljena s časom oziroma z načinom uporabe.



## CARPOVIRUSINE (SC)

Biološki insekticid z želodčnim delovanjem, ki vsebuje virus, specifičen za ličinke jabolčnega zavijača. Vsebuje granulozni virus *Cydia pomonella* (90,9 %) in se ponaša z dolgo obstojnostjo-interval med škropljenji je 13 – 12 dni, neodvisno od števila sončnih dni. Vsebuje največjo količino virusa po hektarju na tržišču in ima karenco 3 dni. Uporaba za zmanjšanje populacije jabolčnega zavijača *Cydia pomonella* na jablani in posledično zmanjšanje poškodb na plodovih.

## PROFESIONALNA SREDSTVA - OSNOVNE SNOVI ZA VARSTVO RASTLIN



## AGRICOLLE

Je sredstvo z mehanskim načinom delovanja. Vsebuje naravne polisaharide, ki ujamejo manjše insekte (uši, ščitkarje, pršice, hrušovo bolšico in druge) na listih ali substratu ter tako zmanjšajo njihovo številčnost. Sredstvo nima ostankov, zato karenca ni potrebna.

Uporablja se na paradižniku, papriki, kumarah, jagodah, jagodičevju, hruškah, drugem sadnem drevju, okrasnih rastlinah ter številnih ostalih vrstah rastlin.

Priporočen odmerek je 30mL/10L oz. 300mL/100L vode. Zaradi mehanskega načina delovanja je potrebna dobra pokritost listov s sredstvom. Tretiranje naredite zgodaj zjutraj ali zvečer, ko so škodljivci najmanj aktivni. Sredstva ne uporabljajte pri močnem soncu ter temperaturah nad 30 °C.

## NAROČILNICA BIOTIČNO VARSTVO 2024

Stranka: \_\_\_\_\_

### ŠKODLJIVI ORGANIZEM - PRŠICE

Št. Art.	KORISTNI ORGANIZMI	Enot v pakiranju	Pakiranje	Kol/EM
9103925	Anderpak	25000	1 tulec	
9103580	Anderbags	250	250 vrečk	
9103926	Andersak	125 000	1 vreča	

### ŠKODLJIVI ORGANIZEM - RESARJI

Št. Art.	KORISTNI ORGANIZMI	Enot v pakiranju	Pakiranje	Kol/EM
9103901	AmblyPAK	50 000	1 tulec	
9103902	AmblySAK	250 000	1 platenka	
9103904	AmblyBAG	1000	500 vrečk	
9103916	OriusM500	500	1 platenka	
9104448	Eolo200	200	1 platenka	

### ŠKODLJIVI ORGANIZEM - ŠČITKARJI

Št. Art.	KORISTNI ORGANIZMI	Enot v pakiranju	Pakiranje	Kol/EM
9103912	EnPAK3000	3000	1 platenka	
9103913	EnPAK15000	15000	1 platenka	
9103915	MiriPAK500	500	1 platenka	

### ŠKODLJIVI ORGANIZEM - MALA HRUŠEVA BOLŠICA

Št. Art.	KORISTNI ORGANIZMI	Enot v pakiranju	Pakiranje	Kol/EM
9103579	Anthopak500	500	1 platenka	

### ŠKODLJIVI ORGANIZEM - MARMORIRANA SMRDLJIVKA

Št. Art.	KORISTNI ORGANIZMI	Enot v pakiranju	Pakiranje	Kol/EM
9103905	Aly250	250	1 platenka	

### ŠKODLJIVI ORGANIZEM - ZELENA SMRDLJIVKA

Št. Art.	KORISTNI ORGANIZMI	Enot v pakiranju	Pakiranje	Kol/EM
9104003	Base500	500	1 platenka	

### ŠKODLJIVI ORGANIZEM - KORUZNA VEŠČA

Št. Art.	KORISTNI ORGANIZMI	Enot v pakiranju	Pakiranje	Kol/EM
9104043	VIS	450 000	1 platenka	

### ŠKODLJIVI ORGANIZEM - UŠI

Št. Art.	KORISTNI ORGANIZMI	Enot v pakiranju	Pakiranje	Kol/EM
9103898	Ada30	30	1 platenka	
9103899	Ada 100	100	1 platenka	
9103900	Ada250	250	1 platenka	
9103906	ErviPAK250	250	1 platenka	
9103907	Mizapak1000	1000	1 platenka	
9103908	Mizapak2000	2000	1 platenka	
9104041	MUX20	20	1 platenka	
9104042	MUX100	100	1 platenka	
9103909	CrisoPAK1000	1000	1 platenka	
9103910	Criso10000	10000	1 platenka	
9103917	Lea50	50	1 platenka	
9103918	Lea250	250	1 platenka	
9104446	Balto 100	100	1 platenka	
9104447	Sfera 100	100	1 platenka	

### ŠKODLJIVI ORGANIZEM - PLODOVA VINSKA MUŠICA

Št. Art.	KORISTNI ORGANIZMI	Enot v pakiranju	Pakiranje	Kol/EM
9104111	Trichopria500	500	1 platenka	
9104112	TrichopriaV	5000	1 platenka	

### ŠKODLJIVI ORGANIZEM - LISTNE ZAVRTAVKE

Št. Art.	KORISTNI ORGANIZMI	Enot v pakiranju	Pakiranje	Kol/EM
9103911	DiglyPAK250	250	1 platenka	

### ŠKODLJIVI ORGANIZEM - ŠKODLJIVCI KORENINSKIH SISTEMOV

Št. Art.	KORISTNI ORGANIZMI	Enot v pakiranju	Pakiranje	Kol/EM
9103919	NEMOPAK HB	50 milijonov	1 škatla	
9103920	NEMOPAK HB 500	500 milijonov	1 škatla	
9103921	NEMOPAK SC	50 milijonov	1 škatla	
9103922	NEMOPAK SC 500	500 milijonov	1 škatla	
9103923	NEMOPAK SF	50 milijonov	1 škatla	
9103924	NEMOPAK SF 500	500 milijonov	1 škatla	

\* enote v paketu predstavljajo odrasli osebki, ličinke, mumije ali parazitirane ličinke bub

Št. Art.	SPECIALNO SREDSTVO	Enot v pakiranju	Pakiranje (EM)	Naročilo Kol / EM
9104016	AGRICOLLE 1 L	12		

Vsi koristni organizmi na tem seznamu so na listi domorodnih organizmov v Sloveniji in z veljavnimi dovoljenji za trženje. Za uporabo domorodnih koristnih organizmov uporabniku ni potrebno pridobiti posebnega dovoljenja.

Uporabnik mora biti strokovno in tehnično usposobljen za vnos, gojenje in uporabo domorodnih organizmov, to pomeni, da upošteva načela dobre kmetijske prakse, varstva okolja oziroma ohranjanja narave in ima primerno tehnično opremo za uporabo koristnih organizmov. Uporabnik, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in je tržni pridelovalec, mora imeti veljavno dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede izobrazbe oziroma strokovne usposobljenosti v skladu s predpisi, ki urejajo fitofarmaceutska sredstva (izpit za izvajalce ukrepov).

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis Stranke: \_\_\_\_\_

Naš partner:



V3