




*Vaš
partner
pri varstvu
rastlin*

STROKOVNA EKIPA



IGOR STERNAD ing. kmetijstva
Prekmurje, Štajerska
031 685 599
igor.sternad@picount.si



MAJA ČREŠNAR univ. dipl. ing. agr.
Gorenjska, Primorska, Goriška,
osrednja Slovenija
031 685 554
maja.cresnar@picount.si



PETER OCVRK trgovski potnik
Koroška, Savinjska in Dolenjska
041 414 971
peter.ocvirk@picount.si



PRIMOŽ REBOLJ dipl. ekonomist
Logistika
08 205 32 00, 051 673 353
primoz.rebolj@picount.si



BLAŽ REBOLJ univ. dipl. ing. agr.
Registracije
051 333 351
blaz.rebolj@picount.si

VINSKA TRTA

VARSTVO VINSKE TRTE PRED BOLEZNIMI

**FOLOW
80 WG**

ČRNA LISTNA PEGAVOST
1,9 Kg/ha

FOLOW 80 WG

PERONOSPORA
1,25 Kg/ha

**MAGMA
TRIPLE WG**

PERONOSPORA
3 kg/ha

TEBUSA 25 % EW

OIDIJ
0,4 L/ha

MICROTHIOL SPECIAL

ČRNA PEGAVOST
2,5-6,25 Kg/ha

MICROTHIOL SPECIAL

OIDIJ
3-8 Kg/ha

POLYVERSUM

SIVA PLESEN
0,25 Kg/ha



0 7 11 13 16 61 71 75 77 89

VARSTVO VINSKE TRTE PRED BOLEZNIMI

— FOLOW 80 WG —

AKTIVNA SNOV:
folpet 80%



- > Je preventivni kontaktni fungicid.
- > Odlično delovanje zoper črno listno pegavost in peronosporo vinske trte.
- > Zoper črno listno pegavost se tretira največ 2x v časovnem presledku 10–12 dni.
- > Zoper peronosporo vinske trte se tretira do 7x v eni rastni sezoni v časovnih presledkih 7 dni.
- > Tveganje, da bi glive povzročiteljice bolezni razvile rezistenco na aktivno snov folpet, je majhno.
- > Sredstvo z najkrajšo karenco med folpeti, 28 dni.

— MAGMA TRIPLE WG —

AKTIVNA SNOV:
cimoksanil 4%, folpet 25%,
fosetil-AI 50%



- > Aktivni snovi fosetil-AI in folpet delujeta sistemsko in kontaktno.
- > Aktivna snov cimoksanil je lokosistemik s translaminarnim delovanjem, ki hitro prodre v tkivo in tam zaustavi razvoj zajedalske gljive v času inkubacijske dobe.
- > Zoper peronosporo vinske trte se tretira do 3x v razmakih 10–14 dni.
- > Ko se sredstvo uporablja v predpisanih odmerkih in na predpisan način ni fitotoksično za gojene rastline.
- > NOVOST – pakiranja 300 g, 1 kg, 3 kg, 6 kg

— TEBUSHA 25% EW —

AKTIVNA SNOV:
tebukonazol 250 g/L



- > Sistemski triazolni fungicid s širokim spektrom delovanja.
- > Deluje preventivno, kurativno in eradikativno.
- > Izredno učinkovito delovanje zoper oidij vinske trte.
- > Sredstvo se lahko uporablja od razvojne faze razpiranja kabrnikov do začetka zorenja grozdja.

— MICROTHIOL SPECIAL —

AKTIVNA SNOV:
žveplo 80 %



- > Sredstvo se uporablja kot preventivni kontaktni fungicid za zatiranje oidija vinske trte.
- > Za zmanjševanje okužb črne pegavosti vinske trte.
- > Skupno se lahko tretira največ 10x v eni rastni dobi v razmaku 7–14 dni.
- > Sredstvo ima tudi stranko delovanje na populacijo pršice trsne kodravosti in trsne pršice.
- > Ekonomično pakiranje 25 kg.

— POLYVERSUM —

AKTIVNA SNOV:
gliva *Pythium oligandrum* M1

- > Izjemno učinkovit EKOLOŠKI preventivni kontaktni (dotikalni) fungicid na podlagi mikroorganizmov.
- > Sredstvo deluje kot mikoparazit, ki z encimsko razgradnjo škodljivim glivam jemlje kisik in hranila.

- > Aktivira naravno zaščito rastline in kot biostimulator spodbuja rast.
- > Sredstvo odlično deluje zoper sivo plesen vinske trte.
- > Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja skladno z navodili za uporabo.
- > Mešanje s fungicidi ni dovoljeno.




NASVET

Za boljšo učinkovitost uporabite močilo SILWET GOLD (glej stran ?).
Priporočamo uporabo mikrohranil FOLIFLO MAIA (Zn), FOLIMAC PLENO (N), FOLIFLO PALE (Mg), FOLIFLO NIXI (Ca), FOLIFLO LUA (Cu), FOLIFLO JANA (B) (glej stran ?).

VARSTVO VINSKE TRTE PRED ŠKODLJIVCI

CORAGEN

KORUZNA VEŠČA
150 mL/ha



CORAGEN


AKTIVNA SNOV:
klorantraniliprol 20%



- > Je kontaktni insekticid z želodčnim delovanjem.
- > Zelo učinkovit zoper križastega grozdnega sukača in pasastega grozdnega sukača.
- > Izhodiščna poraba vode znaša 500 L na višinski meter zelene stene.

SADNO DREVJE

VARSTVO SADNEGA DREVJA PRED BOLEZNIMI



VARSTVO SADNEGA DREVJA PRED BOLEZNIMI

BATALION 450 SC

AKTIVNA SNOV:
pirimetanil 45%

- > Fungicid s preventivnim in delno kurativnim delovanjem.
- Odlično delovanje zoper jablanov in hrušev škrlup.
- S sredstvom se tretira največ 3x v eni rastni dobi z razmaki med tretiranj 7-10 dni.
- Priporočilo je, da se sredstvo na jablani uporabi max. 3x.

ORTHOVIDE 80 WG

AKTIVNA SNOV:
kaptan 80%



- > Dotikalni (kontaktni) fungicid s preventivnim delovanjem.
- > Odlično delovanje zoper jablanov in hrušev škrlup.
- > S sredstvom se tretira največ 10x v eni rastni dobi z razmaki med tretiranj 7-10 dni.
- > NOVOST – ekonomično pakiranje 100 kg.

SCAB 480 SC

AKTIVNA SNOV:
kaptan 48%

- > Kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem.
- > Edini kaptan v tekoči obliki. Večja odpornost proti izpiranju in daljša pokrovnost.
- > Odlično delovanje zoper jablanov in hrušev škrlup.
- > S sredstvom se tretira največ 10x v eni rastni dobi z razmaki med tretiranj 7-10 dni.
- > Karenca samo 21 dni.

MICROTHIOL SPECIAL

AKTIVNA SNOV:
žveplo 80 %



- > Sredstvo se uporablja kot preventivni kontaktni fungicid za jablanove pepelovke in jablanovega škrlupa.
- > Sredstvo ima stransko delovanje na zmanjševanje populacije listne pršice.
- > Skupno se lahko tretira največ 14x v eni rastni dobi v razmaku 7-14 dni.
- > Ekonomično pakiranje 25 kg.

DIFENZONE

AKTIVNA SNOV:
difenokonazol 25%



- > Sistemski fungicid, ki se uporablja preventivno ter le izjemoma v kurativne namene.
- > Odlično delovanje zoper jablanov škrlup.
- > Uporaba največ 4x v eni rastni dobi v razmaku 10-14 dni.

Za boljšo učinkovitost uporabite
močilo SILWET GOLD
(glej stran ?).

NASVET

Priporočamo uporabo mikrohranil
FOLIFLO MAIA (Zn), FOLIMAC PLE-
NO (N), FOLIFLO PALE (Mg), FOLI-
FLO NIXI (Ca), FOLIFLO LUA (Cu),
FOLIFLO JANA (B) (glej stran ?).

VARSTVO SADNEGA DREVJA PRED ŠKODLJIVCI

CORAGEN

270 mL/ha

CARPOVIRUSINE

1 L/ha



31



57



61



71



78

— CORAGEN —

AKTIVNA SNOV:
klorantraniliprol 20%



- > Je kontaktni insekticid z želodčnim delovanjem.
- > Sredstvo se uporablja za zatiranje grizočih žuželk.
- > Odlično zatira jabolčnega zavijača, sadnega zavijača, pasastega sadnega lupinarja in breskovega zavijača.
- > Odlično zatira tudi sadnega listnega sitarja, sadnega listnega zavrtača in sadnega listnega duplinarja.
- > Dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni sezoni v času po odlaganju jačec.

— CARPOVIRUSINE —

AKTIVNA SNOV:
granulozni virus *Cydia pomonella* 90,9 %

- > Biološki insekticid z želodčnim delovanjem, ki vsebuje virus, specifičen za ličinke jabolčnega zavijača. Virus se po zaužitju razmnožuje v ličinki, kar posledično privede do njene smrti.
- > Sredstvo se uporablja na jablani za zmanjšanje populacije jabolčnega zavijača in zmanjšanje poškodb na plodovih.
- > Vsebuje 4 zaščite virusa:
 1. mehčalec vode, ki regulira pH vode;
 2. anti UV zaščito;
 3. vabo;
 4. močilo.
- > Ponaša se z dolgo obstojnostjo- interval med škropljenji je 12-13 dni, neodvisno od števila sončnih dni.
- > Vsebuje največjo količino virusa po hektarju na tržišču.

MOČILA

— TREND 90 —

AKTIVNA SNOV:

izodecil alkohol etoksilat 900 g/L

- > Trend 90 je površinsko aktivno sredstvo, ki omogoča boljše prodiranje herbicida v rastlino in s tem povečuje njegovo učinkovitost.
- > Sredstvo se meša s fitofarmaceutskimi sredstvi. Trend je površinsko aktivno sredstvo, ki omogoča boljše prodiranje v FFS v rastlino in s tem povečuje njegovo učinkovitost. Trend 90 je močilo, ki se uporablja kot dodatek FFS v 0,05-0,1% koncentraciji.
- > Uporaba v vseh kulturah.



— SILWET GOLD —

AKTIVNA SNOV:

heptametiltrisiloksan 80%

- > Do 10 krat povečuje pokrovnost v primerjavi s klasičnimi močili, izboljšuje učinkovitost sredstev za varstvo rastlin in gnojil s tem, da omogoča hitrejši vnos le-teh v zelene dele rastlin, zmanjšuje potrebne količine vode za kakovostno tretiranje, zboljšuje zatiranje insektov in bolezni s tem, da omogoča dostop škroplilne brozge na težko dostopna mesta na rastlinah, je odporen na izpiranje z dežjem.
- > Sredstvo uporabljamo v 0,025-0,1% koncentraciji, vendar največ v odmerku do 0,3 l/ha (2,5 do 10ml na 10l vode oz. 3ml na 100m²).



— CODACIDE —

AKTIVNA SNOV:

rastlinsko olje 95%

- > Codacide je močilo, ki izboljša učinek sredstev za varstvo rastlin. Močilo Codacide zmanjšuje površinsko napetost in izboljša omočenost rastlin. Omogoča boljše prodiranje FFS v rastline, upočasnjuje UV razgradnjo in s tem povečuje učinkovitost sredstev.
- > Codacide ne mešajte s sredstvi na osnovi a.s. kaptan. Sredstva ne uporabljajte pri visokih temperaturah. Ne uporabljajte ga kadar so rastline pod stresom zaradi nizkih temperatur, suše, prevelike količine padavin, pomanjkanja hranil, ter oslabiljene zaradi napada bolezni, škodljivcev ali plevelov.
- > Močilo Codacide se uporablja v kombinaciji z insekticidi Benevia 100 OD, Coragen in Exirel v odmerku 2-2,5L/ha.



BIOSTIMULATORJI IN REGULATORJI RASTI

— TONIVIT — biostimulator

AKTIVNA SNOV:

Fosforjev-pentoksid (P₂₀₅) topen v vodi 13% (w/w) + Kalijev oksid (K₂₀) topen v vodi 5% (w/w) + GA 142 izvlečkom morskih algi *Ascophyllum nodosum*

- > Učinkovita rast in razvoj koreninskega sistema, povečan sprejem/transport koriščenja hranil in vode. Boljše ukoreninjanje in prezimovanje (tretiranje v jeseni). Hitrejša obnova in začetna rast rastline po prezimovanju. Povečana odpornost na neugodne vremenske razmere. Dodatni vir fosforja in kalija, ki sta ključna elementa za razvoj korenin.
- > Uporaba na: zelenjava, sadno drevje, trta, žita, oljna ogrščica, koruza, soja, sončnice, sladkorna pesa, krompir, okrasne rastline.
- > Odmerek: v vinski trti in sadovnjakih v odmerku 3-5 L/ha.

— LEXIN — rastni regulator

AKTIVNA SNOV:

Mešanico huminske in fulvinske kisline, obogatene z auksini

- > Lexin je edinstveno sredstvo za krepitev rastlin. Vsebuje mešanico huminskih kislin, fulvičnih kislin in soli, pri čemer fulvična kislina in njene soli vplivajo na rast in razvoj rastlin ter korenin. Avksini pospešujejo rast in razvoj rastlin. Lexin se dobro meša z vodo. Rastline, ki so bile tretirane s sredstvom Lexin so bolj odporne na različne bolezni ter lažje prenašajo abiotične stresne dejavnike.
- > Priporočljiva uporaba lexina po stresih kot so: spomladi po poškodbah zaradi zmrzali, škoda zaradi toče, močnega dežja in vetra, po herbicidnem šoku, zaradi stresov suša, visoke ali nizke temperature, intenzivno sonce, pomanjkanje hranil itd.
- > Mešanje sredstva: Lexin se lahko meša z mineralnimi gnojili. Pri mešanju s fitofarmaceutskimi sredstvi naredite mešanji preizkus. Ob uporabi Lexina se absorpcijska sposobnost FFS poveča, zato se priporoča (po posvetovanju z zastopnikom), da se običajni odmerek FFS nekoliko zmanjša.
- > V vinski trti in sadovnjakih se uporablja v odmerku 0,25 - 0,5 L/ha ob porabi vode 250 - 2500 L/ha. Priporočena je uporaba 2-4 krat v rastni sezoni. Karenca je 7 dni.

MIKROHRANILA

— FOLIFLO JANA (B) —

AKTIVNA SNOV:
skupni bor 10% (130g/L)



- > Pospešuje oplodnjo in s tem povečuje pridelek.
- > Preprečuje nastanek fizioloških bolezni in poveča odpornost na nizke temperature.
- > Stabilna formulacija pri nizkih kot pri visokih temperaturah.
- > Formulacija na vodni osnovi, brez nitrata in klorida.
- > Uporaba v vinski trti in sadnemu drevju v odmerku 1 L/ha

— FOLIFLO LUA (Cu) —

AKTIVNA SNOV:
baker 25% (400g/L)



- > Izboljšuje naravno odpornost, fotosintezo in sprejem hranil v rastlino.
- > Zagotavlja močne rastline, hiter razvoj ter obilen pridelek.
- > Stabilna formulacija pri nizkih kot pri visokih temperaturah.
- > Formulacija na vodni osnovi, brez nitrata in klorida.
- > Uporaba v vinski trti in sadnemu drevju v odmerku 2-4 L/ha.

— FOLIFLO MAIA (Zn) —

AKTIVNA SNOV:
skupni cink 40%



- > Izjemno učinkovit pri pomankanju cinka. Spodbuja razvoj korenin, obarvanost plodov in zvišuje pridelek.
- > Najpogostejši pojav pomanjkanja cinka se pojavi na izpranih kislih ali bazičnih tleh.
- > Uporaba v vinski trti in sadnemu drevju v odmerku 0,5-1,2 L/ha.

— FOLIFLO NIXI (Ca) —

AKTIVNA SNOV:
kalcijev oksid (CaO) 35% (620g/L)



- > Omogoča zdravo in enakomerno dozorevanje.
- > Preprečuje fiziološke motnje nastale zaradi pomanjkanja kalcija.
- > Stabilna formulacija pri nizkih kot pri visokih temperaturah.
- > Formulacija na vodni osnovi, brez nitrata in klorida.
- > Uporaba v vinski trti in sadnemu drevju v odmerku 2-8 L/ha.

— FOLIFLO PALE (Mg) —

AKTIVNA SNOV:
magnezijev oksid 34% (500g/L)



- > Povečuje tvorbo klorofila.
- > Preprečuje in odpravlja simptome pomanjkanja magnezija.
- > Stabilna formulacija pri nizkih kot pri visokih temperaturah.
- > Formulacija na vodni osnovi, brez nitrata in klorida.
- > Uporaba v vinski trti in sadnemu drevju v odmerku 2,5-5 L/ha.

— FOLIMAC PLENO (N) —

AKTIVNA SNOV:
ureični dušik 11%, dušik z ureičnim formaldehidom 15% + mikrohranila



- > Manj stresa v kritičnih fazah rasti.
- > Preprečevanje pomanjkanja hranil.
- > Močnejša rast in večji pridelek.
- > Trajna razpoložljivost hranil.
- > Uporaba v vinski trti in sadnemu drevju v odmerku 10-20 L/ha.



Fitofarmaceutvska sredstva uporabljajte varno. Pred uporabo preberite etiketo in informacije o sredstvu.
Za nestrokovno oz. nepravilno uporabo FFS-ja ne odgovarjamo.

PICOUNT d.o.o.
Mošnje 2c | 4240 Radovljica
Tel.: 08 205 32 00 | Fax: 08 205 32 03
info@picount.si | www.picount.si