

DIFENZONE



SISTEMIČNI FUNGICID

NAČIN DELOVANJA

Sredstvo DIFENZONE je sistemski fungicid, ki se uporablja preventivno ter le izjemoma v kurativne namene.

AKTIVNA SNOV: difenokonazol 25%

FORMULACIJA: koncentrat za emulzijo (EC)

UPORABA NA: jabolana; malina; pravi peteršilj; robide

UPORABA PROTI: črne listne pegavosti (*Alternaria spp.*); jabolnov škrlup (*Venturia inaequalis*); malinova rja (*Phragmidium rubi-idaei*); odmiranje robidovih rozg (*Rhabdospora ruborum*); pepelovke iz rodu *Erysiphe* (*Erysiphe*); sušica malin (*Didymella applanata*); vijoličasta rja robidnic (*Phragmidium violaceum*)

KARENCA: jabolane 21 dni; peteršilj za listje 14 dni; maline in robide 3 dni

PAKIRANJE: 1L


GLAVNA UPORABA

JABLANE

UPORABA PROTI: zatiranje jabolanskega škrlupa (*Venturia inaequalis*)

ODMEREK: 0,2 L/ha

KARENCA: 21 dni



Sredstvo DIFENZONE se uporablja na jablanah za zatiranje jabolanskega škrlupa (*Venturia inaequalis*) v odmerku 0,2 L/ha. Tretira se po nastopu pogojev za okužbo od fenološke faze konca cvetenja, do faze začetka zorenja plodov (BBCH 71-79).

OPOZORILA

Na istem zemljišču je na jablanah dovoljeno uporabljati sredstva na osnovi aktivne snovi difenokonazol in druga sredstva, ki pripadajo skupini z enakim načinom delovanja največ štiri krat v eni rastni dobi v 10 do 14 dnevni razmikih, ki jih je treba prilagoditi pritisku bolezni.



MANJŠA UPORABA

PETERŠILJ ZA LISTJE

Za listje za zatiranje gliv iz rodu *Alternaria* (*Alternaria spp.*) in *Erysiphe* (*Erysiphe spp.*) v odmerku **0,5 L/ha** pri porabi vode 300–500 L/ha (5 mL na 100 m² na 3–5 L vode). Tretira se v fenološki fazi razvoja vegetativnih delov rastlin, primernih za pridelek (BBCH 40–49). Na istem zemljišču se s sredstvom lahko peteršilj tretira največ dva krat v eni rastni dobi v najmanj 14-dnevnem razmiku med tretiranjema.

ROBIDE

Zatiranje vijoličaste rje robidnic (*Phragmidium violaceum*) in odmiranja robidovih rozg (*Rhabdospora ruborum*) v odmerku **0,4 L/ha** pri porabi vode 600–1000 L/ha (4 mL na 100 m² na 6–10 L vode). Tretira se od razvoja listov do pojava socvetij (BBCH 13–49). Na istem zemljišču se s sredstvom lahko peteršilj tretira največ dva krat v eni rastni dobi v najmanj 7-dnevnem razmiku med tretiranjema.

MALINE

Zatiranje malinove rje (*Phragmidium rubi-idaei*) in sušice malin (*Didymella applanata*) v odmerku **0,4 L/ha** pri porabi vode 600–1000 L/ha (4 mL na 100 m² na 6–10 L vode). Tretira se od razvoja listov do pojava socvetij (BBCH 13–49). Na istem zemljišču se s sredstvom lahko peteršilj tretira največ dva krat v eni rastni dobi v najmanj 7-dnevnem razmiku med tretiranjema.