

# ANGELUS



## TALNI HERBICID

### NAČIN DELOVANJA

Sredstvo ANGELUS je talni herbicid z rezidualnim učinkom. Vsebuje aktivno snov klomazon, ki pripada skupini izoksazolidinoni (HRAC 13).

**AKTIVNA SNOV:** klomazon 36%

**FORMULACIJA:** kapsulirana suspenzija (SC)

**UPORABA NA:** krompir, oljna ogrščica

**UPORABA PROTI:** enoletni širokolistni pleveli

**KARENCA:** je zagotovljena s časom uporabe


**PAKIRANJE:** 1 L, 5 L

### KROMPIR

**UPORABA PROTI:** navadni plešec (*Capsella bursa-pastoris*) in navadno zvezdico (*Stellaria media*); - zmanjšuje številčnost populacije plezajoče lakote (*Galium aparine*); - omejeno deluje tudi zoper belo metliko (*Chenopodium album*), navadno rosnico (*Fumaria officinalis*), škrlatnordečo mrtvo koprivo (*Lamium purpureum*) in navadni slakovec (*Polygonum convolvulus*).

**ODMEREK:** 0,25 L/ha ob porabi vode 200 - 400 L/ha

**KARENCA:** Zagotovljena s časom uporabe



0,25 L/ha

**PRIPOROČILO UPORABE:** Za doseganje optimalnega delovanja sredstva se priporoča uporaba v času takoj po setvi in pred vznikom plevela. Za optimalno delovanje je potrebna zadostna vlažnost tal.




## OLJNA OGRŠČICA

**UPORABA PROTI:** plezajočo lakoto (*Galium aparine*), škrlatnordečo mrtvo koprivo (*Lamium purpureum*), navadni plešec (*Capsella bursa-pastoris*), navadno zvezdico (*Stellaria media*) in njivski mošnjak (*Thlaspi arvense*); - zmanjšuje številčnost populacije jetičnikov (*Veronica spp.*); - omejeno deluje tudi zoper žabji koprca (*Descurainia sophia*)

**ODMEREK:** 0,33 L/ha ob porabi vode 200 - 400 L/ha

**KARENCA:** Zagotovljena s časom uporabe



0,33 L/ha

**PRIPOROČILO UPORABE:** Za doseganje optimalnega delovanja sredstva se priporoča uporaba v času takoj po setvi in pred vznikom plevela. **Za optimalno delovanje je potrebna zadostna vlažnost tal.**

**OPOZORILA:** S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Rastline, ki so v času tretiranja s herbicidom ANGELUS v fazi vznika, se lahko močno poškodujejo. Tretiranje je dovoljeno samo ob mirnem vremenu ali rahlem vetru. Tretiranje se izvaja v smeri pihanja vetra in stran od ljudi.

V času tretiranja s sredstvom ANGELUS mora biti posejano seme prekrito z najmanj 2 cm prsti.

**FITOTOKSIČNOST:** Sredstvo, uporabljeno v predpisanem času (pred vznikom posevka), lahko na gojenih rastlinah povzroči prehodne znake fitotoksičnosti.

**MEŠANJE:** Glede mešanja z drugimi fitofarmaceutskimi sredstvi se je pred uporabo sredstva treba posvetovati z imetnikom registracije ali zastopnikom v Sloveniji.