

# SUNDA



Sharda Cropchem

## SELEKTIVNI SISTEMIČNI HERBICID

### NAČIN DELOVANJA

Sredstvo SUNDA vsebuje aktivno snov fenoksaprop-P-etil, ki deluje kot inhibitor encima acetil-koencim A karboksilaza v procesu sinteze lipidov. Sredstvo SUNDA je selektivni sistemični herbicid, ki v rastlino vstopi preko listov in se od tam premesti do ravnega vršička, kjer zavre njegovo rast.

**AKTIVNA SNOV:** Fenoksaprop-p-etil 6,9%

**FORMULACIJA:** koncentrirana emulzija – olje v vodi (EW)

**UPORABA NA:** v jarem ječmenu, jari in ozimni pšenici, ozimni rži in ozimni tritikali

**UPORABA PROTI:** gluhi oves (*Avena fatua* L.), navadni srakoprec (*Apera spicaventi* L.), navadna kostreba (*Echinochloa crus-galli* L.) in ozkolistnimi pleveli

**KARENCA:** je zagotovljena s časom uporabe


**PAKIRANJE:** 1 L, 5 L

Uporaba na	Odmerek	Vrsta plevela
<b>OZIMNI PŠENICI, OZIMNI RŽI, OZIMNI TRITIKALI</b>	<b>1,2 L/ha</b>	navadni srakoprec ( <i>Apera spicaventi</i> ) in gluhi oves ( <i>Avena fatua</i> )
<b>JAREM JEČMENU, JARI PŠENICI</b>	<b>1 L/ha</b>	navadni srakoprec ( <i>Apera spicaventi</i> ), gluhi oves ( <i>Avena fatua</i> ) in navadna kostreba ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )

Odmerek je ob porabi vode 200–400 L/ha.

**OPOZORILA:** S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 1 krat v eni rastni sezoni. Ne tretira se pri temperaturah zraka pod 4 °C in nad 25 °C. Ne tretira se po slani ali kadar se pričakuje slana. Potrebno je preprečiti zanašanje na sosednje posevke.

**ČAS UPORABE:** S sredstvom SUNDA se tretira po vzniku, od razvojne faze, ko je prvi list prodrl skozi koleoptilo, do faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 10– 32).



**OPOZORILA:** S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 1 krat v eni rastni sezoni. Ne tretira se pri temperaturah zraka pod 4 °C in nad 25 °C. Ne tretira se po slani ali kadar se pričakuje slana. Potrebno je preprečiti zanašanje na sosednje posevke.

**FITOTOKSIČNOST:** Sredstvo lahko povzroča prehodno fitotoksičnost na jarem ječmenu in ozimni pšenici, vendar so ti znaki fitotoksičnosti prehodnega značaja in jih po nekaj tednih na gojenih rastlinah ni več opaziti.

\*Fitofarmaceutska sredstva uporabljajte varno. Pred uporabo preberite etiketo in informacije o sredstvu. Za nestrokovno oz. nepravilno uporabo FFS-ja ne odgovarjamo.

PICOUNT d.o.o.

Mošnje 2c | 4240 Radovljica

Tel.: 08 205 32 00 | Fax: 08 205 32 03

info@picount.si | www.picount.si

