

PROMINO XTRA



SISTEMIČNI FUNGICID

NAČIN DELOVANJA

Sredstvo PROMINO XTRA ima zaradi vsebnosti dveh aktivnih snovi, azoksistrobina in protiokonazola preventivno in kurativno delovanje. Aktivna snov azoksistrobin s FRAC kodo 11 pripada glede na način delovanja skupini QoI fungicidov, aktivna snov protiokonazol s FRAC kodo 3 pa skupini DMI fungicidov (triazoli, inhibitorji sinteze sterola).

AKTIVNA SNOV: azoksistrobin 14 %, protiokonazol 10 %

FORMULACIJA : koncentrat za emulzijo (EC)

UPORABA NA: ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, ozimni in jari rži, ozimni tritikali, ozimni in jarni oljni ogrščici

UPORABA PROTI: v **pšenici** za zatiranje rij iz rodu *Puccinia* (*Puccinia spp.*) in temne pegavosti pšenice (*Pyrenophora tritici-repentis*) ter delno zatiranje pšenične listne pegavosti (*Zymoseptoria tritici*), za zatiranje okužb s fuzariozami (*Fusarium spp.*), v **ječmenu** za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti (*Pyrenophora teres*) in ječmenovega listnega ožiga (*Rhynchosporium secalis*), v **rži** za zatiranje rij iz rodu *Puccinia* (*Puccinia spp.*) in ječmenovega listnega ožiga (*Rhynchosporium secalis*), v **tritikali** za zatiranje rij iz rodu *Puccinia* (*Puccinia spp.*), temne pegavosti pšenice (*Pyrenophora tritici-repentis*) in ječmenovega listnega ožiga (*Rhynchosporium secalis*), v **oljni ogrščici** za zatiranje bele gnilobe (*Sclerotinia sclerotiorum*) in črne listne pegavosti kapusnic (*Alternaria brassicae*)

KARENCA : Karenca je zagotovljena s časom uporabe

PAKIRANJE: 5 L


OPT-on TEHNOLOGIJA: V KOLIKOR PRIDE DO PADAVIN V ROKU DVEH UR PO NANOSU, SE PO ZASLUGI NOVE TEHNOLOGIJE FORMULACIJE OPT-on UČINKOVITOST PROIZVODA PROMINO XTRA NE ZMANJŠA.

OZIMNA IN JARA PŠENICA

UPORABA PROTI: za zatiranje **rje** iz rodu *Puccinia* (*Puccinia spp.*) in **temne pegavosti pšenice** (*Pyrenophora tritici-repentis*) ter **delno zatiranje pšenične listne pegavosti** (*Zymoseptoria tritici*), za **delno zatiranje okužb s fuzariozami** (*Fusarium spp.*)

ODMEREK: 1,4 L/ha

S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ 2 krat v eni rastni sezoni s 14 dnevnim razmakom med tretiranj.




UZIMNI IN JARI JEČMEN

UPORABA PROTI: za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti (*Pyrenophora teres*) in ječmenovega listnega ožiga (*Rhynchosporium secalis*)

ODMEREK: 1,4 L/ha

S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ 2 krat v eni rastni sezoni s 14 dnevним razmakom med tretiranjmi.



UZIMNA IN JARA RŽ, UZIMNA TRITIKALA

UPORABA PROTI: rji iz rodu *Puccinia* (*Puccinia spp.*) in ječmenovega listnega ožiga (*Rhynchosporium secalis*) ter pri tritikali še zoper temne pegavosti pšenice (*Pyrenophora tritici-repentis*)

ODMEREK: 1,4 L/ha

S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ 2 krat v eni rastni sezoni s 14 dnevним razmakom med tretiranjmi. Tretiranje se opravi od razvojne faze začetka kolenčenja do faze konca klasenja (BBCH 30–59).


UZIMNA IN JARA OLJNA OGRŠČICA

UPORABA PROTI: za zatiranje bele gnilobe (*Sclerotinia sclerotiorum*) in črne listne pegavosti kapusnic (*Alternaria brassicae*).

ODMEREK: 1,2 L/ha

Tretiranje se opravi od razvojne faze, ko so vidni prvi venčni listi, cvetni brsti še vedno zaprti (»rumen brst«), do faze konca cvetenja (BBCH 59–69). S sredstvom se lahko oljno ogrščico na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.

Priporočena poraba vode je 200–400 L.



FITOTOKSIČNOST: Sredstvo PROMINO XTRA, uporabljeno v skladu z navodilom za uporabo, ni fitotoksično za gojene rastline.

Fitofarmacevstka sredstva uporabljajte varno. Pred uporabo preberite etiketo in informacije o sredstvu. Za nestrokovno oz. nepravilno uporabo FFS-ja ne odgovarjamo.